


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ (информация для пациентов) по медицинскому применению лекарственного средства **Линимент бальзамический (по Вишневскому)**

**Торговое название:** Линимент бальзамический (по Вишневскому).

**Международное непатентованное название:** -

**Форма выпуска:** линимент.

**Описание:** линимент от светло-коричневого до зеленовато-коричневого цвета со специфическим запахом.

**Состав:** одна туба (40 г) содержит: *действующих веществ*: дёгтя берёзового – 1,2 г, ксероформа – 1,2 г; *вспомогательные вещества*: кремния диоксид коллоидный безводный, масло касторовое.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептические и дезинфицирующие средства.

**Код АТС:** D08AX.

### **Показания к применению**

Неинфицированные послеоперационные и посттравматические раны кожи и мягких тканей.

### **Способ применения и дозы**

Применяют наружно у взрослых. Наносят 2–3 раза в сутки тонким слоем на пораженные участки кожи или накладывают на протяжении срока, определенного тяжестью протекания процесса и переносимостью препарата.

В случае применения под повязкой перед ее накладыванием рану очищают от некротических тканей, раскрывают пузыри, промывают антисептическим раствором. Накладывают повязку в 5–6 слоев марли с препаратом, фиксируют. Повязку меняют 1 раз на 2–3 дня. Курс лечения составляет 10–12 суток.

### **Побочные действия**

При продолжительном применении возможно раздражение кожи в виде покраснения, отека, зуда на месте нанесения лекарственного средства.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность, острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (в т.ч. абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эмпиема плевры).

### **Передозировка.**

При длительном применении возможны проявления местной аллергической реакции (высыпания, зуд), что требует проведения десенсибилизирующей терапии.

### **Меры предосторожности**

Линимент предназначен только для наружного применения. Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки, особенно в глаза! В случае попадания промыть большим количеством воды.

Руки после нанесения линимента необходимо тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков препарата в глаза, нос, рот.

Если признаки заболевания не начнут исчезать или в случае ухудшения состояния, возникновения любых нежелательных явлений, необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

### **Беременность и лактация.**

Применение при беременности и лактации допускается только по назначению врача, с учетом соотношения пользы для матери и потенциального риска для плода/ребенка.

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

*Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.* Не описана.

**Дети.** Данные относительно безопасности и эффективности применения отсутствуют.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.


**Упаковка**

40 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

При температуре не выше 15 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.



**Срок годности**

5 лет. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Информация о производителе**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612.