



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
лекарственного средства
ЧЕРЕДЫ ТРАВА
(BIDENTIS HERBA)

Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства.

Сохраняйте этот листок – вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его еще раз.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Торговое название. Череды трава.

Международное непатентованное название (МНН). Отсутствует.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Состав. Череды трава, 50,0 г.

Описание. Цвет зеленый, буровато-зеленый или зеленовато-фиолетовый с грязновато-желтыми вкраплениями. Запах слабый. Вкус горьковатый, слегка вяжущий.

Трава череды содержит флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, эфирное масло, каротиноиды, аскорбиновую кислоту, полисахариды, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, применяемые в дерматологии.

Код АТХ. D11AX.

Фармакологические свойства. Лекарственное средство растительного происхождения. Обладает противовоспалительным, диуретическим, потогонным и противомикробным действием.

Показания к применению:

Внутрь:

- в комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

Наружно:

- экссудативный диатез, пиодермия.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозировка. 10 г (3 столовые ложки) травы помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин, охлаждают 45 мин при комнатной температуре, процеживают. Оставшееся сырьё отжимают. Объём полученного настоя доводят кипячёной водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ стакана 2-3 раза в день после еды.

При наружном применении для приготовления ванн используют 1 стакан настоя на ванну.

Перед употреблением настоев рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к лекарственному средству. При применении внутрь – беременность; период лактации; детский возраст до 12 лет; заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, тяжелые заболевания сердца и/или почек).

Побочное действие. Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. Информация отсутствует.

Меры предосторожности. Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и



лактации не рекомендуется.



Применение у детей. В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 12 лет не рекомендуется.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и работе с механизмами. Исследования по оценке влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Условия хранения. В защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Приготовленный настой – в прохладном месте (при температуре от 8 °С до 15 °С) не более 2 суток.

Условия отпуска из аптек. Отпускают без рецепта врача.

Срок годности. 3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка. В пакеты бумажные по 50,0 г (первичная упаковка). Пакет бумажный вместе с листком-вкладышем помещают в пачку (вторичная упаковка).

Производитель. ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, 223043, Минская область, Минский район, Папернянский с/с, д. Цнянка, ул. Армейская, д. 8, ком. 7. Тел. (017) 500 33 01, тел./факс (017) 500 33 46.