


НД РБ

9541 - 2021



Утверждено
Министерством здравоохранения
Республики Беларусь

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
информация для потребителей
по медицинскому применению лекарственного препарата
ПРОПОСОЛ-АВ

Регистрационный номер:

Торговое название: Пропосол-АВ.

Международное непатентованное название: отсутствует
Лекарственная форма: спрей для местного применения.

Состав (на 1 баллон)

Активное вещество:

Прополис

- 3,0 г

Вспомогательные вещества:

этанол (спирт этиловый 95 %)

- 40,0 г

глицерол (глицерин)

- 7,0 г

Описание

Жидкость от зеленовато-желтого до коричневого цвета с характерным запахом прополиса.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в стоматологии. Противомикробные и антисептические средства для местного применения при заболеваниях полости рта.

Код АТХ: A01AB11.

Фармакологические свойства

Препарат природного происхождения на основе продукта жизнедеятельности пчел – прополиса. Оказывает противовоспалительное, противомикробное, болеутоляющее, действие, стимулирует процессы регенерации.

Показания к применению

Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта: катаральный гингивит и стоматит, афтозный и язвенный стоматит, пародонтит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и продуктам пчеловодства, экзема, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием клинических данных).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется (в связи с отсутствием клинических данных).

Способ применения и дозы

9541 - 2021

Местно. Перед применением снимают с баллона предохранительный колпачок и на шток клапана надевают распылитель с наконечником, нажимают несколько раз для того, чтобы раствор поступил в распылитель. После выхода раствора из распылителя наконечник направляют в полость рта и нажимают на распылитель 3-4 раза, равномерно орошают воспаленную область. Длительность распыления – до 2 секунд. В остром периоде воспалительного процесса орошение производят 2-3 раза в день, при уменьшении воспалительного процесса – 1-2 раза в день до полного выздоровления (обычно в течение 3-7 дней).

Побочное действие

Аллергические реакции, в том числе кратковременное жжение, покраснение, зуд в месте нанесения препарата, ангионевротический отек.

При возникновении аллергических реакций, применение препарата необходимо прекратить и обратиться к врачу.

Передозировка

При передозировке препарата возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. В этом случае применение препарата следует прекратить.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Меры предосторожности

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,28 г, в максимальной суточной дозе – 0,84 г.

Это необходимо учитывать группам высокого риска, в число которых входят пациенты с заболеваниями печени и головного мозга, эпилепсией, черепно-мозговой травмой, алкоголизмом.

Перед применением препарата рекомендуется промыть ротовую полость теплой кипяченой водой. После орошения ротовой полости желательно не употреблять пищу в течение 15-30 мин.

Упаковку следует предохранять от ударов, падений, прямых солнечных лучей. Недопустимо попадание препарата в глаза.

Не рекомендуется наносить на раневую поверхность и кровоточащие слизистые оболочки. Если во время применения лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат содержит этиловый спирт, поэтому в период применения следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Спрей для местного применения.

По 50 г в баллоны аэрозольные алюминиевые, снабженные механическим насосом, распылительной насадкой и предохранительным колпачком. Каждый баллон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте вдали от источников огня.


НД РБ

Срок годности

3 года.

95 4 1 - 2 0 2 1

Не применять после истечения срока годности.



Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель /организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «Алтайвитамины»

659325, Россия, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Телефон: (3854) 326-948, 338-719

Факс (3854) 326-943

www.altayvitamin.ru