

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)  
**БЕРЕЗЫ ПОЧКИ**  
Betulae gemmae

04 11 2016 1084

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

**Общая характеристика**

Почки удлиненно-конические, заостренные или притупленные, часто клейкие. Чешуйки расположены черепицеобразно, плотно прижаты по краям, слегка реснитчатые (нижние короче верхних и иногда с несколько отстающими кончиками); длина 2-7 мм, ширина — от 1,0 мм до 3 мм. Цвет коричневый, у основания иногда зеленоватый. Запах бальзамический.

Березы почки содержат эфирное масло, аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, флавоноиды, жирные кислоты (линовую, линоленовую и др.), смолистые вещества и другие биологически активные вещества.

**Форма выпуска**

Цельное сырье.

**Фармакотерапевтическая группа**

Прочие средства, применяемые для лечения урологических заболеваний.

**Фармакологические свойства**

Настой почек березы обладает диуретическим действием.

**Показания к применению**

*Внутрь:* в составе комплексной терапии в качестве диуретического средства при заболеваниях мочевыводящих путей легкой степени тяжести.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к лекарственному средству, включая гиперчувствительность к пыльце березы или другим растительным компонентам. Гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность. Заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, тяжелые заболевания сердца или почек).

Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

**Способ применения и дозы**

5 г (1 чайная ложка) почек помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут. Охлаждают не менее 45 минут при комнатной температуре, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутрь в теплом виде по 1/3 стакана 2-3 раза в день за 10-15 минут до еды.

Продолжительность приема определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

## **Побочное действие**

Возможно развитие нарушений желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея) и аллергических реакций (зуд, сыпь, крапивница, аллергический ринит). При длительном применении может вызвать раздражение почечной паренхимы и обострение воспалительных заболеваний почек.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

## **Меры предосторожности**

Чтобы обеспечить увеличение количества мочи в процессе лечения **необходим адекватный прием жидкости**.

Настой почек березы следует принимать с осторожностью, **под контролем анализа мочи**.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, появляются нарушения мочеиспускания, боль, кровь в моче), необходимо обратиться к врачу.

*Применение при беременности и лактации.* В связи с отсутствием данных не рекомендуется применять во время беременности и лактации.

*Применение у детей.* Применение у детей в возрасте до 12 лет не рекомендуется из-за отсутствия достаточных данных.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.* Исследования не проводились.

## **Передозировка**

Информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

## **Условия хранения**

В защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25)°С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой - не более 2-х суток при температуре (8-15) °С.

## **Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия отпуска**

Без рецепта врача.

## **Упаковка**

По 50 г в пакете бумажном в пачке. Листок-вкладыш (информация для пациента) вкладывается в пачку.

**Производитель:** ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12,  
[www.padiss.by](http://www.padiss.by).

СОРГАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО РЕПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
Ирина Министр здравоохранения

Республиканская служба по надзору