

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от «*30*» *11* *2010* № *139*

Бессмертника песчаного цветки, цельное сырье 35 г или 30 г в пачке
Helichrysi arenarii flos

Общая характеристика:

корзинки шаровидные, одиночные или по нескольку вместе на коротких шерстисто-войлочных цветоносах длиной до 1 см, диаметром около 7 мм. Цвет лимонно-желтый или оранжевый. Запах слабый, ароматный.

Бессмертника песчаного цветки содержат флавоноидные гликозиды, флавоноиды, дубильные вещества, каротиноиды, полисахариды, следы эфирного масла и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Цельное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, применяемые для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

Фармакологические свойства. Лекарственное средство оказывает желчегонное действие, обладает диуретическими свойствами, стимулирует секреторную функцию желудка и поджелудочной железы.

Показания к применению. В комплексной терапии хронического некалькулезного холецистита и дискинезии желчевыводящих путей. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 10 г (3 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1 столовой ложке 2-3 раза в день за 15-30 минут до еды.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Кратность приема и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Особенности применения у пациентов с нарушениями функции почек: информация отсутствует.

Особенности применения у пациентов с нарушениями функции печени: см. разделы «Противопоказания» и «Меры предосторожности».

Побочное действие. Возможны аллергические реакции. При длительном применении возможно развитие холестаза.
В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к бессмертнику, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, ромашка, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема. Желчнокаменная болезнь, обтурационная желтуха, острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит в стадии обострения. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

Меры предосторожности: Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. Из-за возможной стимуляции секреции желчи лекарственное средство не следует принимать в случае обструкции желчевыводящих путей, желчнокаменной болезни, холангита, острых воспалительных заболеваний печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.


Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность применения во время беременности и кормления грудью не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и кормления грудью не рекомендуется.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования по оценке влияния применения лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Применение у детей. Применение у детей в возрасте до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

Передозировка. Длительное применение лекарственного средства может привести к развитию застоя желчи. В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Данные о взаимодействиях с другими лекарственными средствами ограничены. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.



Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный отвар при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

Срок годности. 4 года.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 35 г или 30 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В пачку картонную вложен листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by

