

Листок-вкладыш: информация для потребителя**Витапрост® 10 мг, суппозитории ректальные**

Действующее вещество: водорастворимые пептиды в виде простаты экстракта

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 10 дней Вам следует обратиться к врачу.

Содержание данного листка:

1. Что из себя представляет препарат Витапрост® суппозитории ректальные, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Витапрост® суппозитории ректальные
3. Применение препарата Витапрост® суппозитории ректальные
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Витапрост® суппозитории ректальные
6. Содержимое упаковки и прочие сведения



1. Что из себя представляет препарат Витапрост® суппозитории ректальные, и для чего его применяют

Витапрост® обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

Витапрост® нормализует параметры предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

Показания к применению

Хронический простатит.

Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через 10 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Витапрост® суппозитории ректальные

Не применяйте препарат Витапрост® суппозитории ректальные:

- если у Вас аллергия (повышенная чувствительность) на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Витапрост® суппозитории ректальные обратитесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

Препарат Витапрост® суппозитории ректальные применяют только для лечения взрослых мужчин. Не применяют у женщин и детей.

Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением препарата Витапрост® применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.

До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

В случае появления или развития стойких, неясных или новых симптомов Вам следует обратиться к врачу.

Другие препараты и препарат Витапрост® суппозитории ректальные

Препарат Витапрост® суппозитории ректальные может применяться в комплексной терапии.

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Беременность и грудное вскармливание

Препарат не применяют у женщин.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата Витапрост® суппозитории ректальные

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Витапрост® суппозитории следует использовать только ректально, после самопроизвольного опорожнения кишечника или очистительной клизмы. Перед применением следует вынуть суппозиторий из контурной ячейковой упаковки.

Не проглатывать суппозитории!

Применяют по 1 суппозиторию 1 раз в день. После введения суппозитория желательно пребывание в постели в течение 30-40 минут.

Длительность курса лечения препаратом Витапрост® – не менее 10 дней.

При необходимости возможно проведение повторных курсов.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Если вы приняли препарата Витапрост® суппозитории ректальные больше, чем следовало.

О случаях передозировки препарата Витапрост® не сообщалось.

При наличии вопросов по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать

нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении данного препарата возможны аллергические реакции.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Товарищеский пер., 2а, г. Минск, 220037

+375-17-299-55-14

www.rceth.by

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

5. Хранение препарата Витапрост® суппозитории ректальные

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и контурной ячейковой упаковке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте лекарственные препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Витапрост® суппозитории ректальные содержит

Действующим веществом являются водорастворимые пептиды в виде простаты экстракта. Каждый суппозиторий содержит: водорастворимые пептиды – 10 мг в виде простаты экстракта – 50 мг.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: жир твердый (Витепсол, марки Н 15, W 35, Суппосир, марки NA 15, NAS 50).

Внешний вид препарата Витапрост® суппозитории ректальные и содержимое упаковки

Суппозитории ректальные.

Суппозитории от белого до белого с желтоватым или серовато-буроватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом.

Одну или две контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО «Нижфарм», Россия

6222 - 2017

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603950



Все претензии потребителей направлять представителю держателя
регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

АО «Нижфарм», Россия

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603950

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

Листок-вкладыш пересмотрен