

ИНСТРУКЦИЯ

(листок-вкладыш для пациентов)

по медицинскому применению лекарственного средства

БОНДЖИГАР

СОГЛАСОВАНОМИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬПриказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусьот 20.12.2018 г. № 1365КЛС № 12 от 03.12.2018 г.**Торговое название:** БОНДЖИГАР**Международное непатентованное название:** нет.**Форма выпуска:** Желатиновые капсулы.**Описание:**

Желатиновые капсулы темно-коричневого цвета размера 0, на корпусе и колпачке напечатано «BONJIGAR»

Состав: каждая капсула содержит: *активные вещества:**Смесь высушенных густых водных экстрактов:* Вербезины белой листьев (3.57 : 1) – 70,0 мг, Солодки голой корней (3.33 : 1) – 60,0 мг, Расторопши пятнистой надземных частей (3.33 : 1) – 60,0 мг, Цикория обыкновенного семян (3.5 : 1) – 50,0 мг, Барбариса острого плодов (3.75 : 1) – 40,0 мг, Пикрорризы курроа корней и корневищ (3.7 : 1) – 27,0 мг, Берхавии раскидистой надземных частей (3.7 : 1) – 27,0 мг, Тамарикса гребенщика плодов (3.7 : 1) – 27,0 мг, Редьки посевной семян (3.85 : 1) – 13,0 мг, Паслена черного плодов (3.85 : 1) – 13,0 мг, Сферантуса индийского цветков (3.85 : 1) – 13,0 мг; *вспомогательные вещества:* кукурузный крахмал, кальция гидрофосфат, целлюлоза микрокристаллическая (Е-460).*Состав желатиновой капсулы:* натрия лаурилсульфат (Е-487), метилпарабен (Е-218), пропилпарабен (Е-216), желатин, вода очищенная, титана диоксид (Е-171), краситель хинолиновый желтый (Е-104), краситель красный очаровательный (Е-129), краситель бриллиантовый голубой (Е-133).*Состав чернил:* шеллак, безводный спирт, изопропиловый спирт, бутанол, пропиленгликоль, натрия гидроксид, повидон, титана диоксид (Е-171).**Фармакотерапевтическая группа:** традиционное растительное лекарственное средство.**Код АТС:** V03AX.**Фармакологическое действие**

Комбинированный традиционный растительный препарат, использование основано исключительно на основе длительного опыта применения.

Область применения

Традиционный растительный препарат. БОНДЖИГАР применяются как средство фитотерапии при заболеваниях печени. БОНДЖИГАР используется для улучшения субъективных жалоб, таких как потеря аппетита, чувство давления в правой верхней части живота, при токсико-нутритивных повреждениях печени и гепатите.

Способ применения и дозы

Внутри взрослым по 1 капсуле 3 раза в день после еды. Капсулы следует проглатывать, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Курс лечения – 6 недель. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.



Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Беременность.
- Период грудного вскармливания.
- Детский возраст (до 18 лет).
- Желчнокаменная болезнь.
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром Золлингера-Эллисона.
- Острый панкреатит или обострение хронического панкреатита.
- Кишечная непроходимость.

Передозировка

Нет сообщений относительно передозировки препаратом. При передозировке необходимо промыть желудок и назначить симптоматическую терапию.

Применение у детей

В связи с отсутствием достаточных данных лекарственное средство противопоказано для приема детям и подросткам до 18 лет

Применение при беременности и кормления грудью

Применение лекарственного средства во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано в связи с отсутствием данных о безопасности.

Влияние на способность управлять транспортом и потенциально опасными механизмами

Исследования по оценке влияния применения лекарственного средства на способность к вождению автотранспорта и работу с движущимися механизмами не проводились.

Особые указания

- При вирусном гепатите эффективность применения препарата не изучена.
- Не назначать препарат натошак!

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно применение лекарственного средства со спазмолитиками и метоклопрамидом.

Условия хранения

Беречь от детей

Хранить при температуре не выше 25 °C

Срок годности

3 года

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке

Форма выпуска:

По 20 и по 60 капсул с пакетиком силикагеля в пластмассовом флаконе почти белого цвета. Флакон закрывается рефленным колпачком с защитой от доступа детей (контроль первого вскрытия) и тисненным текстом на поверхности. Флакон с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта врача

Производитель:

Herbion Pakistan Private Limited Пакистан, Карачи, 74900, промышленная зона Карачи, участок 30. Представительство компании «Herbion Pakistan Private Limited» Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пр. Независимости, д. 25, к. 131, тел.: 200-84-01