



**Листок-вкладыш – информация для потребителя  
АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД (ацикловир), 200 мг, 400 мг, таблетки**

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что собой представляет препарат АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД
3. Применение препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД,  
и для чего его применяют**

Действующим веществом препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД является ацикловир, который относится к группе лекарств, называемых противовирусными препаратами. Ацикловир работает, убивая или останавливая рост вирусов. АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД используется для:

- лечения ветряной оспы, опоясывающего герпеса (опоясывающего лишая);
- лечения герпеса, генитального герпеса и других инфекций, вызванных вирусом простого герпеса;
- профилактики обострений этих инфекций после того, как они у вас возникли;
- профилактики обострений этих инфекций у людей с ослабленной иммунной системой, когда организм менее способен бороться с инфекциями.

**2. О чем следует знать перед применением препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД  
Не принимайте АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД, если:**

- у вас аллергия на ацикловир или валацикловир или любой из компонентов препарата, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша;

Если вы не уверены, относится ли к вам что-либо из вышеперечисленного, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД.

**Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- у вас проблемы с почками;
- вам больше 65 лет.

Если вы не уверены, применимо ли к вам что-либо из вышеперечисленного, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД.

Во время приема АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД важно пить много воды.



### **Другие препараты и АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД**

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится и к препаратам, отпускаемым без рецепта врача, в том числе лекарственным травам. Сообщите врачу, если вы принимаете:

- пробенецид, который применяется для лечения подагры;
- циметидин, который применяется для лечения язвы желудка;
- микофенолят мофетил, предотвращающий отторжение пересаженных органов.

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с врачом перед применением АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД может вызывать вялость или сонливость. При появлении этих симптомов откажитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами и обратитесь к врачу.

### **Важная информация о некоторых компонентах лекарственного препарата**

В состав таблеток АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД входит лактоза. Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть по сути не содержит натрия.

## **3. Применение препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД**

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

### **Рекомендуемая доза**

#### **Взрослые**

Доза, которую вы должны принять, будет зависеть от того, для чего вам назначил АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД ваш лечащий врач.

#### **Лечение ветряной оспы, опоясывающего герпеса (опоясывающего лишая):**

- обычная доза составляет 800 мг 5 раз в день каждые 4 часа;
- предлагаемое время: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 и 23:00;
- вам следует принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД 7 дней.

#### **Лечение герпеса, генитального герпеса и других инфекций, вызванных вирусом простого герпеса:**

- обычная доза составляет 200 мг 5 раз в день каждые 4 часа;
- предлагаемое время: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 и 23:00;
- вам следует принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД 5 дней или дольше, если вам назначит врач.

#### **Профилактика обострений этих инфекций после того, как они у вас возникли:**

- обычная доза составляет 200 мг 4 раза в день каждые 6 часов;
- вам следует принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД до тех пор, пока врач не скажет вам прекратить.

#### **Профилактика обострений этих инфекций у людей с ослабленной иммунной системой, когда организм менее способен бороться с инфекциями:**

- обычная доза составляет 200 мг 4 раза в день каждые 6 часов;
- вам следует принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД до тех пор, пока врач не скажет вам прекратить.

#### **Ваш врач может скорректировать дозу АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД, если:**

- лекарство принимает ребенок



- вам больше 65 лет

- у вас проблемы с почками. Если у вас проблемы с почками, важно пить много воды во время лечения АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД.

Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД, если к вам применимо что-либо из вышеперечисленного.

#### **Способ применения**

По возможности проглатывайте таблетки целиком после еды, запивая достаточным количеством жидкости (например, одним стаканом воды).

Риска/насечка на таблетке нанесена для облегчения разламывания таблетки при возникновении затруднений при ее проглатывании целиком.

Таблетки ацикловира не подходят для детей младше 6 лет, которые могут испытывать трудности при глотании. Для детей этого возраста рекомендуется использовать более подходящие лекарственные формы выпуска (например, жидкие).

#### **Если вы приняли препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД больше, чем следовало**

АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД обычно не опасен, если только вы в течение нескольких дней не принимали слишком большую дозу. Обратитесь к врачу, если вы приняли слишком много АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД. Возьмите с собой упаковку препарата.

#### **Если вы пропустили прием препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД**

Если вы забыли принять АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД, примите его, как только вспомните. Однако, если уже пришло время приема следующей дозы, пропустите забытую дозу. Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу.

#### **Если вы досрочно прекращаете прием препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД**

Ваш лечащий врач сообщит вам, как долго нужно принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД. Если вы досрочно прекратите прием препарата, это может привести к возврату заболевания.

При наличии дополнительных вопросов по применению данного препарата обратитесь к врачу.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме этого лекарства могут возникнуть следующие нежелательные реакции:

**Аллергические реакции** (редко: могут возникнуть менее чем у 1 человека из 1000)

Если у вас развилась аллергическая реакция, **прекратите принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД и немедленно обратитесь к врачу**. Признаки могут включать:

- сыпь, зуд или крапивница на коже;
- отек лица, губ, языка или других частей тела;
- одышка, хрипы или затрудненное дыхание;
- падение кровяного давления (коллапс).

Другие возможные нежелательные реакции включают:

**Часто** (могут проявляться менее чем у 1 из 10 человек):

- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- боли в животе;
- зуд, сыпь, в том числе кожная реакция, возникающая после воздействия света (светочувствительность);
- повышенная утомляемость;



- необъяснимая лихорадка и чувство слабости, особенно при вставании.

**Нечасто** (могут проявляться менее чем у 1 из 100 человек):

- зудящая сыпь, похожая на крапивницу;
- выпадение волос.

**Редко** (могут проявляться менее чем у 1 из 1000 человек):

- повышение количества креатинина и мочевины в крови;
- повышение количества билирубина и печеночных ферментов;

**Очень редко** (могут проявляться менее чем у 1 из 10 000 человек):

- снижение количества эритроцитов (анемия);
- снижение количества лейкоцитов (лейкопения);
- снижение количества тромбоцитов (клеток, которые способствуют свертыванию крови) (тромбоцитопения);
- чувство волнения или замешательства;
- неспособность ясно мыслить или судить (спутанность сознания);
- дрожь или тремор;
- шаткость при ходьбе и нарушение координации;
- нарушения речи;
- галлюцинации (видеть или слышать то, чего нет);
- судороги;
- чувство необычной сонливости или вялости;
- паралич части или всего тела;
- нарушения поведения, речи и движений глаз;
- жесткость шеи и чувствительность к свету;
- потеря сознания (кома);
- воспаление печени (гепатит);
- пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);
- проблемы с почками, при которых у вас мало или совсем нет мочи;
- боль в пояснице, в области почек или чуть выше бедра (почечная боль).

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### **5. Хранение препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Датой истечения срока годности является последний день месяца, предшествующего указанному на упаковке.

#### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

*Действующее вещество* – ацикловир. Каждая таблетка содержит 200,0 мг или 400,0 мг ацикловира.

*Вспомогательные вещества*: целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), повидон К 30, магния стеарат, лактоза моногидрат.

**Внешний вид препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД и содержимое упаковки**  
АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД, таблетки, представляют собой:





- дозировка 200 мг: таблетки круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и риской с одной стороны, белого или почти белого цвета. Риска не предназначена для деления таблетки на равные части, но может применяться для разламывания таблетки с целью облегчения ее проглатывания;

- дозировка 400 мг: таблетки капсуловидные, двояковыпуклые, белого или почти белого цвета, с насечкой с одной стороны. Насечка не предназначена для деления таблетки на равные части, но может применяться для разламывания таблетки с целью облегчения ее проглатывания.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. Одну, две или три контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

**Условия отпуска:** по рецепту.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель:**

РУП «Белмедпрепараты»,  
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,  
ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,  
e-mail: [medic@belmedpreparaty.com](mailto:medic@belmedpreparaty.com)



За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

**Листок-вкладыш пересмотрен:**

**Прочие источники информации:**

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: [www.rceth.by](http://www.rceth.by).