

27 925 - 2020

Листок-вкладыш – информация для пациента
Меновазин, раствор для наружного применения

Действующие вещества: левоментол, прокаина гидрохлорид, бензокаин

Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем, рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Меновазин, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Меновазин.
3. Применение препарата Меновазин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Меновазин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.



1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ МЕНОВАЗИН, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Меновазин – лекарственный препарат для наружного применения, обладающий местным обезболивающим и противозудным действием.

Показания к применению

Препарат Меновазин показан к применению для:

- облегчения болевого синдрома при невралгии, миалгии, артралгии;
- уменьшения зуда при зудящих дерматозах.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА МЕНОВАЗИН

Не применяйте препарат Меновазин, если:

– у Вас аллергия на левоментол, бензокаин, прокаин или на любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;

– у Вас есть в анамнезе аллергические реакции на местные анестетики (обезболивающие), такие как прокаин, бутакан или любые другие «-каиновые» анестетики;

– у Вас подозрение на метгемоглобинемию (состояние, характеризующееся появлением в крови повышенного количества метгемоглобина);

– у Вас склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш;

– у Вас эпилепсия, судороги в анамнезе;

Меновазин не рекомендуется использовать у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Препарат нельзя наносить на большие участки кожи, на участки кожи с проявлениями экземы, солнечных ожогов, инфекции или повреждения.

Не применяйте препарат Меновазин, если Вы используете **другие лекарственные препараты** для местного применения, сульфаниламиды или ингибиторы холинэстеразы (см. раздел «Другие препараты и препарат Меновазин»).

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, сообщите лечащему врачу и прекратите применение препарата Меновазин.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Меновазин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Местные анестетики не следует применять пациентам с полной блокадой сердца (полным прекращением проведения импульса на предсердия и некоторые другие отделы сердца).

Перед использованием Меновазин Вы должны проконсультироваться с врачом, если у Вас есть зуд по всему телу. Не наносить на поврежденную кожу и кожу с проявлениями аллергии!

При нанесении раствора на кожу не должна возникать боль. В случае возникновения боли, отека или высыпаний на коже необходимо прекратить применение лекарственного препарата и немедленно обратиться к врачу. После местного применения средств, содержащих ментол, были сообщения о развитии ожогов. После нанесения лекарственного препарата не рекомендуется применять местное тепло (грелки, лампы, пакеты или бутылки с горячей водой) в связи с увеличением риска возникновения кожных реакций. Пациентам с повышенной чувствительностью не следует принимать горячий душ или ванну до или после применения лекарственного препарата.

Если после применения лекарственного препарата эффект отсутствует или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Не наносить на кожу лица!

Не следует допускать попадание раствора в глаза, поскольку ментол, который содержится в препарате, может вызвать сильное раздражение!

Если Вы случайно проглотили препарат Меновазин, обратитесь к врачу.

Другие препараты и препарат Меновазин

Сообщите лечащему врачу, если Вы применяете, недавно применяли или собираетесь применять любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без назначения врача.

Некоторые препараты можно применять вместе с препаратом Меновазин, а другие могут вызывать нежелательные реакции при совместном применении с препаратом Меновазин. В частности, Меновазин может взаимодействовать с лекарственными препаратами, перечисленными ниже:

- компоненты препарата снижают антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов; усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием (в частности, бензокаин);
- ингибиторы холинэстеразы (например, галантамин, донепезил) ингибируют метаболизм бензокаина;
- при одновременном применении с другими препаратами для местного применения могут создаваться новые соединения с непредвиденным эффектом.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Не следует применять Меновазин во время беременности и в период лактации.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние на способность управления автотранспортом или работу с другими механизмами не выявлено.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЕНОВАЗИН

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Препарат Меновазин следует наносить и растирать на коже 2–3 раза в день.

Применение у детей и подростков

Опыт применения у детей отсутствует. Применение препарата Меновазин у детей и подростков в возрасте до 18 лет противопоказано.

Путь и (или) способ введения

Препарат Меновазин показан для наружного применения. Препарат следует наносить на кожу над пораженной областью и на пораженные участки кожи.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней. При сохранении болевого синдрома и/или кожного зуда более 7 дней, необходимо проконсультироваться с врачом.

Если Вы применили препарата Меновазин больше, чем следовало

Если Вы применили препарата Меновазин больше, чем следовало, немедленно обратитесь к врачу или работнику аптеки.

При продолжительном применении возможно появление головокружения, общей слабости, снижение артериального давления.

Вдыхание больших доз ментола может привести к развитию головокружения, спутанности сознания, мышечной слабости, тошноты и двоения в глазах.

При случайном приеме препарата внутрь возможно появление тошноты, диареи, ректальных язв, нарушение сердечного ритма, эпилептических судорог, потери сознания, нарушения дыхания с остановкой дыхания, расстройства координации движений и других нарушений со стороны центральной нервной системы.

При появлении нежелательных реакций незамедлительно обратитесь к врачу или работнику аптеки.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Меновазин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Меновазин:

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- увеличение концентрации метгемоглобина в крови;
- реакции гиперчувствительности;
- аллергический дерматит.
- бронхоспазм, ларингоспазм (характерным симптомом которых является затрудненное дыхание и остановка дыхания) у пациентов с повышенной чувствительностью.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе, на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы так же можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

27.9.2020

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЕНОВАЗИН

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Хранить при температуре не выше 25 °С. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Срок годности: 2 года.

Не применяйте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Меновазин содержит:

Действующие вещества: левоментол, прокаина гидрохлорид, бензокаин.

Каждый флакон содержит: действующих веществ – левоментола – 1,0 г, прокаина гидрохлорида – 0,4 г, бензокаина – 0,4 г.

Вспомогательные вещества: Этиловый спирт 70 %.

Внешний вид препарата Меновазин и содержимое упаковки

Бесцветная прозрачная жидкость с запахом ментола.

По 40 мл во флаконе из стекла, укупоренные пробками или пробками с уплотнительными элементами и крышками навинчиваемыми пластмассовыми.

Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка №1).

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: +375 (177) 735612, 731156

E-mail: market@borimed.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен