

**Инструкция по медицинскому применению
МИРРОСЕПТ,
0,1 мг/мл раствор для наружного применения**

Действующее вещество: МИРИТИН (МИРАМИСТИН)

ПЕРЕД ПРИЕМОМ ДАННОГО ПРЕПАРАТА ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ ЛИСТОК. ПОСКОЛЬКУ В НЕМ СОДЕРЖАТСЯ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС СВЕДЕНИЯ

- Сохраните этот листок. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Этот препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим. Он может навредить этим людям, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в данном листке.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО ЛИСТКА

1. Что из себя представляет МИРРОСЕПТ, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата МИРРОСЕПТ
3. Применение препарата МИРРОСЕПТ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата МИРРОСЕПТ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения



1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИРРОСЕПТ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Лекарственный препарат Мирросепт содержит действующее вещество миритин (мирамистин). Миритин – антисептическое средство, которое оказывает противовирусное, противогрибковое и антибактериальное действие.

МИРРОСЕПТ применяют по следующим показаниям

Хирургия, травматология: профилактика нагноений и лечение гнойных ран. Лечение гнойно-воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата.

Комбустиология: лечение поверхностных и глубоких ожогов II и IIIA степени, подготовка ожоговых ран к дерматопластике.

Дерматология и венерология: лечение и профилактика пиодермий и дерматомикозов, кандидозов кожи и слизистых оболочек, микозов стоп.

Индивидуальная профилактика заболеваний, передаваемых половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, генитальный кандидоз и др).

Урология: комплексное лечение острых и хронических уретритов и уретропростатитов специфической (хламидиоз, трихомониаз, гонорея) и неспецифической природы.

Стоматология: лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта: стоматитов, гингивитов, пародонтитов, периодонтитов. Гигиеническая обработка съёмных протезов.

Акушерство-гинекология: профилактика и лечение нагноений послеродовых травм, ран промежности и влагалища, послеродовых инфекций, воспалительных заболеваний.

При заболеваниях ЛОР-органов: комплексное лечение наружного отита и тимпанита, синусита,

гайморита, тонзиллита.

У детей в возрасте от 3 до 14 лет применяется для комплексного лечения острого фарингита, обострения хронического тонзиллита.

24805-2023



2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА МИРРОСЕПТ

Не применяйте МИРРОСЕПТ:

- при повышенной чувствительности к миритину (мирамистину), или любому другому компоненту этого лекарства (см. раздел 6 «Содержимое упаковки и прочие сведения»);
- у детей до 3-х лет.

Если что-то из перечисленного касается Вас, сообщите об этом лечащему врачу или работнику аптеки.

Меры предосторожности при применении МИРРОСЕПТ:

Не следует допускать попадания препарата в глаза.

Опыт клинического применения у детей ограничен. Использование у детей требует врачебной консультации для оценки соотношения ожидаемой пользы и возможного риска использования Мирросепта.

Другие лекарственные препараты и МИРРОСЕПТ

При одновременном применении с антибиотиками отмечено усиление их противобактериальных и противогрибковых свойств.

Беременность и кормление грудью

Нет данных о безопасности применения лекарственного средства во время беременности и в период лактации. Возможно применение препарата, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с потенциально опасными механизмами не наблюдалось.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МИРРОСЕПТ

Всегда принимайте данный препарат точно так как назначил лечащий врач. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если Вы не уверены.

Как применять МИРРОСЕПТ

Способ применения. Местно, наружно.

Указания по использованию упаковки с вагинальным аппликатором:

1. Удалить колпачок с флакона.
2. Извлечь прилагаемый вагинальный аппликатор из защитной упаковки.
3. Навинтить вагинальный аппликатор на флакон, не снимая насадку урологическую.

Режим дозирования

Хирургия, травматология, комбустиология: с профилактической и лечебной целью раствором Мирросепта 0,1 мг/мл орошают поверхность ран и ожогов, рыхло тампонируют раны и свищевые ходы, фиксируют марлевые тампоны, смоченные антисептиком. Лечебная процедура повторяется 2-3 раза в сутки в течение 3-5 дней. Высокоэффективен метод активного дренирования ран и полостей с суточным расходом около 1 л препарата.

Акушерство, гинекология: с целью профилактики послеродовой инфекции применяется в виде влагалищных орошений до родов (5-7 дней), в родах после каждого влагалищного

исследования и в послеродовом периоде по 50 мл препарата в виде тампона с экспозицией 2 ч, в течение 5 дней. Для удобства влагалищного орошения рекомендуется использование вагинального аппликатора. Содержимое флакона с помощью вагинального аппликатора ввести во влагалище и произвести орошение. При родоразрешении женщин путем кесарева сечения, непосредственно перед операцией обрабатывают влагалище, во время операции – полость матки и разрез на ней, а в послеоперационном периоде вводят тампоны, смоченные препаратом, во влагалище с экспозицией 2 ч в течение 7 дней. Лечение воспалительных заболеваний проводится курсом в течение 2-х недель путем внутри влагалищного введения тампонов с препаратом, а также методом лекарственного электрофореза. 24806-2022

Венерология: для профилактики венерических заболеваний препарат эффективен, если он применяется не позже 2-х ч после полового акта. Содержимое флакона с помощью урологической насадки ввести в мочеиспускательный канал на 2-3 мин: мужчинам (2-3 мл), женщинам (1-2 мл) и во влагалище (5-10 мл). Для удобства рекомендуется использование вагинального аппликатора. Обработать кожу внутренних поверхностей бедер, лобка, половых органов. После процедуры рекомендуется не мочиться в течение 2-х часов.

Урология: В комплексном лечении уретритов и уретропростатитов проводят впрыскивание в уретру 2-3 мл препарата 1-2 раза в день, курс – 10 дней.

Оториноларингология. При гнойных гайморитах – во время пункции верхнечелюстная пазуха промывается достаточным количеством препарата. Тонзиллиты, фарингиты и ларингиты лечат полосканием горла и/или орошением с помощью насадки-распылителя, 3-4-х кратным нажатием, 3-4 раза в сутки. Количество препарата на одно полоскание 10-15 мл. При наружном отите, тимпаните: турунды, смоченные раствором, вводить в наружный слуховой проход на 2-3 часа в течение 6-8 дней.

Стоматология. При стоматитах, гингивитах, пародонтитах рекомендуется полоскание ротовой полости 10-15 мл препарата 3-4 раза в сутки.

Дети. Для лечения острого фарингита либо обострения хронического тонзиллита – орошение глотки с применением насадки-распылителя:

- дети 3-6 лет: однократное нажатие с кратностью 3-4 раза в сутки;
- дети 7-14 лет: двукратное нажатие с кратностью 3-4 раза в сутки;
- дети от 14 лет: трех- или четырехкратное нажатие 3-4 раза в сутки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. При приеме препарата могут возникнуть следующие побочные эффекты:

- аллергических реакции*, чувство жжения в месте применения* (проходит самостоятельно в течение 10-15 с и не требует отмены препарата).

* - исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно.

При появлении указанных либо других побочных реакций, неуказанных в инструкции, необходимо прекратить применения препарата и обратиться к врачу.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в инструкции по применению препарата. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях через национальную систему сообщения о нежелательных реакциях и неэффективности лекарственных препаратов:

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: с использованием формы извещения о нежелательной реакции на сайте www.rceth.by, по электронной почте rcpl@rceth.by или по адресу:

24805-2022



5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МИРРОСЕПТ

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Срок годности: 3 года. Не применяйте данный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните при температуре не выше 25 °С.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

МИРРОСЕПТ содержит. Действующим веществом является миритин (мирамистин).

1 мл лекарственного препарата содержит действующее вещество: миритин (мирамистин) – 0,10 мг.

Вспомогательным веществом является вода для инъекций.

Внешний вид лекарственного препарата и содержимое упаковки

Форма выпуска и описание. Бесцветный прозрачный раствор, пенящийся при встряхивании.

Упаковка. По 30 мл в пластиковые флаконы из полиэтилена высокого давления со спрейером с насадкой в упаковке № 1. По 100 мл во флаконы полимерные, укупоренные полимерными распылительной насадкой или винтовым колпачком, в упаковке № 1, по 100 мл во флаконы из полиэтилена высокого давления, укупоренные полимерным резьбовым колпачком, в упаковке № 1 или по 100 мл во флаконы-капельницы из полипропилена с навинчиваемой крышкой и насадкой капельницей из полиэтилена высокого давления в комплекте с вагинальным аппликатором в упаковке № 1. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещен в пачку из картона.

По 5000 мл во флаконах полимерных, укупоренных полимерным винтовым колпачком, с наклеенным листком-вкладышем. В комплектации имеется ручка полимерная для переноски.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

Республика Беларусь, 222603, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, к. 3

Тел./факс: +375 (17) 373-31-90, тел.: +375 (1770) 5-93-59

E-mail: mail@pharmland.by