

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению для пользователя
(Листок-вкладыш)

НД РБ

ГЕКСАСПРЕЙ

5474 - 2016

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, прежде чем начать использовать данный препарат, потому что она содержит важную информацию.

Всегда применяйте этот препарат в соответствии с информацией в этой инструкции или предоставленной Вашим врачом или фармацевтом.

- Сохраните эту инструкцию, возможно, Вам понадобится прочитать ее снова.
- Обратитесь к своему фармацевту за советом или информацией.
- Если у Вас возникли какие-либо побочные эффекты, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Это также касается любых побочных явлений, не упомянутых в данной инструкции. См. раздел 4.
- Обратитесь к врачу, если не чувствуете никакого улучшения или чувствуете себя хуже через несколько дней.

ЧТО СОДЕРЖИТСЯ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ?

1. Что такое ГЕКСАСПРЕЙ?
2. Что нужно знать перед применением ГЕКСАСПРЕЙ?
3. Как применять ГЕКСАСПРЕЙ?
4. Каковы возможные нежелательные эффекты?
5. Как хранить ГЕКСАСПРЕЙ?
6. Содержимое упаковки и другая информация.

1. ЧТО ТАКОЕ ГЕКСАСПРЕЙ И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Код АТХ: R02AA20.

Биклотимол относится к классу бифенолов. Активность биклотимола направлена в основном на грамположительные микроорганизмы: в исследованиях *in vitro* максимальный эффект проявлялся уже через 15 минут воздействия на бактериальную взвесь раствором биклотимола с максимальной концентрацией (90%).

Показания к применению

Местное лечение острых инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и глотки. Местное лечение боли в горле, не сопровождающейся жаром.

Обратитесь к врачу, если не чувствуете никакого улучшения или чувствуете себя хуже через 5 дней.

2. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕКСАСПРЕЙ?

Никогда не применяйте ГЕКСАСПРЕЙ:

- Если у Вас аллергия в анамнезе на один из компонентов этого препарата.
- Лекарственные препараты для слизистой полости рта и горла во флаконе под давлением противопоказаны младенцам (дети до 2,5 лет) из-за риска ларингоспазма.

В СЛУЧАЕ СОМНЕНИЙ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ ИЛИ ФАРМАЦЕВТОМ.

Меры предосторожности

Особые предосторожности

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТОТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ В ДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Во время использования флакон держать вертикально. Перед применением флакон взболтать.

Длительное использование (более 5 дней) нежелательно, так как оно может изменить естественный баланс микробов в горле.

Препарат содержит соевый лецитин. Если у Вас аллергия на арахис или сою, не применяйте этот препарат.

Данный лекарственный препарат содержит 35 мг бензилового спирта на дозу. Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции и легкое местное раздражение.

Предосторожности при применении

В случае возникновения лихорадки, гнойной мокроты (отхаркиваний), затрудненного проглатывания пищи и в случае ухудшения состояния или отсутствия улучшения по окончании 5 дней: ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СВОИМ ВРАЧОМ.

Другие препараты и ГЕКСАСПРЕЙ

Этот лекарственный препарат содержит биклотимол. Другие препараты также его содержат. Не сочетайте их, чтобы не превысить максимальные рекомендуемые дозы.

Беременность и грудное вскармливание

Не принимайте этот лекарственный препарат, не проконсультировавшись с врачом или фармацевтом.

В качестве меры предосторожности не следует использовать препарат во время беременности и при грудном вскармливании.

Посоветуйтесь с врачом или фармацевтом перед приемом любого лекарственного препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и движущимися механизмами

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и движущимися механизмами.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ ГЕКСАСПРЕЙ?

Пожалуйста, всегда применяйте этот лекарственный препарат, тщательно соблюдая эту инструкцию или назначения врача или фармацевта.

Детям от 2,5 до 6 лет применять по строгим указаниям врача.

В случае сомнений обращайтесь за уточнениями к врачу или фармацевту.

Дозировка: ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ СТАРШЕ 2,5 ЛЕТ.

Рекомендуемая доза: 2 распыления, 3 раза в день.

Способ применения: местно в ротоглотке.



ПОВЕРНУТЬ



НАЖАТЬ



ДА



НЕТ

ВСТРЯХИВАТЬ ПЕРЕД КАЖДЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ
 Для распыления достаточно повернуть стержень наконечника по оси на четверть оборота.
ДЕРЖАТЬ ВЕРТИКАЛЬНО ВО ВРЕМЯ РАСПЫЛЕНИЯ.

Продолжительность лечения: Лечение длится не дольше 5 дней.

Если у Вас есть другие вопросы об использовании этого лекарственного средства, обратитесь за дополнительной информацией к врачу или фармацевту.


Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют

4. КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ?

Как и все препараты, этот препарат может вызывать нежелательные эффекты, но они не возникают систематически у всех.

Нежелательные эффекты перечислены ниже в порядке частоты:



5474 - 2016

Очень редко (могут проявляться у до 1 человека на 10000): Отек губ, крапивница, кожная сыпь, эритема, отек Квинке.

Присутствие метилпарагидроксибензоата (E218) может быть причиной аллергических реакций.

Заявление о побочных эффектах

Если у Вас возникнут какие-либо нежелательные эффекты, сообщите об этом врачу или фармацевту. Это также относится к любым нежелательным эффектам, не упомянутым в этой инструкции.

Сообщения о нежелательных реакциях могут быть направлены:

- контактному лицу компании на территории Республики Беларусь по электронной почте rv@recordati.by, моб. +375 33 683 00 70, тел/факс +375 17 378-07-71;

- в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: по адресу: Товарищеский пер. 2ф, г. Минск, 220037, Республика Беларусь, тел/факс 242-00-29, по электронной почте rcpl@rceth.by, по телефону 22-00-29 или на сайте www.rceth.by.

Претензии по качеству лекарственных средств следует сообщать ответственному представителю на территории Республики Беларусь по тел/факс +375-17-378-07-71.

Сообщая о нежелательных эффектах, Вы помогаете предоставить больше информации о безопасности препарата.

5. КАК ХРАНИТЬ ГЕКСАСПРЕЙ?

Хранить при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата окончания срока годности относится к последнему дню этого месяца.

Не подвергайте воздействию высоких температур.

Не выбрасывайте препараты в канализацию или с бытовым мусором. Попросите фармацевта выбросить препараты, которые Вы больше не используете. Эти меры будут способствовать защите окружающей среды.

Срок годности

5 лет. Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке или флаконе.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит ГЕКСАСПРЕЙ?

Состав (на флакон в 30г)

Действующие вещества:

Биклотимол0,75 г

Вспомогательные вещества:

Бензиловый спирт, динатрия эдетат, метилпарагидроксибензоат (E218), аниса звездчатого семян масло, аммония глицирризинат, натрия сахаринат,

5474 - 2016

авицел RC 591 (целлюлоза микрокристаллическая и кармеллоза натрия),
лецитин соевый, глицерол, этанол 96%, вода

Содержимое упаковки ГЕКСАСПРЕЙ**Описание содержимого флакона**

Однородная суспензия белого с желтоватым ~~оттенком цвета с характерным~~
запахом аниса

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Упаковка

По 30 г в стеклянный флакон (тип стекла 3), покрытым снаружи пластиком (ПВХ), закрытым пластиковой крышкой с распылительным клапаном, с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель:

Лаборатории БУШАРА-РЕКОРДАТИ, Франция