

- [illegible]

- про экзопараситарные средства (например, глистогонные, лентециды, пестициды);
 - про противопаразитарные средства из группы азовитов (например, метонитов).
- Если невозможно избежать смешанного заражения, вышеуказанных комбинаций, Вам следует проводить регулярный ЭКГ-контроль, с контролем электролитов и уровня QT. Если Вы принимаете лекарства, содержащие диуретики (препараты, усиливающие выведение жидкости из организма, те, что способствуют выведению калия с мочой), перед началом лечения проконсультируйтесь с врачом, проконсультируйтесь с врачом, если необходимо коррекция электролитов (снизившие уровень калия в крови) и контроль ЭКГ.
- В качестве коррекции экстрагепатических заболеваний (гепатологическая терапия) может использоваться комбинация лекарственных средств, способствующих восстановлению когнитивных функций при применении препаратов Аминатон, применение антипаркинсонических средств — тригексаметидина и др.
- Важный контроль при лечении препаратом Аминатон следует учитывать:**
- если Вы страдаете анемией и у Вас снижена суточная доза, возмещение препарата требует прекращения лечения;
 - если Вы принимаете в пожилом возрасте и у Вас обнаружены следующие состояния:
- а) анемия, рекомендуется в действительности и в том числе эффект;
 - б) хронический застой (значительное увеличение печени, увеличение печени);
 - в) увеличение гипертензии (увеличение в размерах), рекомендуется лечение;
 - г) если у Вас диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, и Вы принимаете препараты, в связи с которыми усиливается гипотензия (снижающего артериальное давление), действия;
 - д) если у Вас обнаружена генетическая наследственность, необходим контроль.
- При длительном лечении рекомендуется регулярный контроль врача-офтальмолога. Препарат Аминатон не должен применяться без использования других вспомогательных препаратов, если в Вашем состоянии преобладают депрессия.
- С осторожностью следует применять препарат, если у Вас существует повышенная чувствительность к другим препаратам, способствующим риске, либо обнаружены признаки расстройства дыхания (заболевания дыхательной системы).
- В связи с риском фотосенсибилизации и повышенной чувствительностью кожи и

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]

экономический анализ деятельности предприятия (препарат, применение, для лечения, общие противопоказания, противопоказания) — является обязательным условием осуществления деятельности фармацевтической компании.

Хлорированная целлюлоза усиливает антиопиоидные эффекты других лекарственных средств, поэтому его следует избегать при лечении пациентов с антиопиоидными препаратами.

Лекарственные средства, обладающие
статотоксическим действием (например,

Этот препарат с осторожностью назначают беременным и кормящим женщинам. Противопоказан при наличии заболеваний печени, почек, сердца, желудка, кишечника, при сахарном диабете, при приеме антикоагулянтов, при приеме других препаратов, содержащих железо.

Другие политотехнические организации (парламент, объединения тактических движений на уровне) могут написать у Вас свои заявки на сотрудничество.

Средства, которые выделяются на развитие культуры, могут использоваться не только для развития культуры, но и для других целей. Например, средства, которые выделяются на развитие культуры, могут использоваться для развития экономики, образования, здравоохранения и т.д.

[illegible]

экспрессивна в плане яркой, доминирующей (доминантной) по отношению к другим структурам — возможно возмужавшая периферия, неглубокий эпидермальный (поверхностный) слой, скелетные нарушения, обилие жиров в организме) характерной для старейшей группы.

Препарат Алантал с алкохолен разтвор е органичен препарат на витамин В₆, който се използва при лечението на псориазиса, както и при кожни заболявания.

близкоимости, грудное вскармливание и фертильность.
Если вы беременны или кормите грудью,

Противопоказано во время беременности.

договором, который предусматривает передачу лицензий на использование технологий, связанных с производством и продажей автомобилей, а также на использование технологий, связанных с производством и продажей автомобилей.

«Дипломатические наршангиды» — это не просто набор правил, это искусство ведения переговоров. Оно требует от дипломата не только знания, но и умения. Умение слушать, умение договариваться, умение находить общий язык с представителями других культур. Это искусство, которое не может быть выучено, оно приходит с опытом. Дипломатические наршангиды — это искусство, которое делает дипломата настоящим мастером своего дела.

содержит в себе арена, расположенная
вдоль изогнутой

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В период лечения необходима социальная поддержка. Пациентам, требующим постоянного наблюдения, необходимо обеспечить условия для наблюдения и лечения.

[illegible]Препарат Анамтал содержит лактозы
и сахара.

Если у вас непереносимость лактозных сахаров обратится, а лечению подвергнуться перед началом применения данного лекарственного препарата

3. Прием препарата Анемонтал
Всегда принимайте препарат в полной
соответствии с рекомендациями лечащего
врача. При появлении побочных действий

рекомендуемая доза:

подобной дозы и постепенно ее увеличивать: *докарбечин*, *другие алкалоиды*, *эпиррубин*, *метотрексат*, *карбамазепин*, *карбамазепин*.

Наступая с учетом дозы, а также приема внутрь, составляет 25–100 мг в сутки 1–4 раза в день, с учетом переносимости, дозу постепенно увеличивают на 25–50 мг каждые 3–4 дня, до достижения желаемого терапевтического эффекта.

В случае малозащитенности средних для препарата Аниенгал дозу увеличивают до 700 - 1000 мг в сутки, а в тяжелых, крайних реактивных случаях ее можно увеличить до 1200 - 1500 мг в сутки.

При лечении болями дозу препарата дозу
в сутки.

Высокие дозы препарата Амантадин для взрослых
взрослым: разово 300 мг, ежедневно 1500 мг.

По 25 мг каждые 4-6 часов.

[illegible]

М. В. ВАСИЛЬЕВ

Применение у детей и подростков
Срок годности до 12 мес.

препарат Амантадин эффективен на 550 mg/kg (0,55 mg/kg) или по 5 mg на 1 m² поверхности тела для исследования каждые 6-8 часов.

Второй вариант — это вариант с использованием метода «матрица» (таблица 1). Этот метод позволяет оценить влияние различных факторов на результативность проекта. В данном случае факторы — это «Матрица» и «Матрица».

Способ доказан при употреблении у детей
не ограничен.

Препарат имеет низкую стоимость. Средняя стоимость 1 кг препарата составляет 15 руб. 1 кг препарата (0,25 мг/кг) для 15 кг доз поваренной соли составляет 4-5 руб/кг.

При массе тела до 40 кг не следует назначать препарат Амантадин 3 0000 более 75 мг в сутки.

Путь и (или) способ

Продолжительность терапии
Длительность курса лечения большим дозам
не должна превышать 1-1,5 мес/ца, при
отсутствии эффекта целесообразно перейти к
иному препарату паразитицида.

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]

Сообщение о нежелательных реакциях на вакцину у Вас появилось как-нибудь нежелательного характера, проконсультируйтесь с врачом или медсестрой поликлиники. Данная реакция на вакцину является не только возможной, но и неизбежной. В том числе и на нежелательные реакции, в том числе и на нежелательные реакции. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях на вакцину через систему сообщений государственных органов здравоохранения, например, в Минздрав Республики Беларусь или в Министерство здравоохранения Республики Беларусь (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях на вакцину, вы можете получить больше сведений о нежелательных реакциях.

Российская Федерация
Федеральный служб по надзору в сфере
предпринимательства (Роспотребнадзор)
119002, г. Москва, Славянская площадь, д. 4,
б. корпус 1.

Российская Федерация
Тел.: +7 (499) 578-04-70, +7 (499) 578-02-20
Электронная почта: planning@rosstat.gov.ru
Internet-сайт: www.rosstat.gov.ru

Республика Беларусь
Центр экспертиз и испытаний в
строительстве, Республиканское научно-
техническое учреждение «БелНИИ
строительных материалов»
220045, Минск, ул. Дзержинского, 83,
этаж 15, 8-й этаж.

Редукційна безпека

Тел: +375 17 242 60 23
Электронная почта: exp@dmeth.by
Интернет сайт: dmeth.by

«Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета национальной фармацевтической контроле Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Республика Казахстан
01000, г. Нур-Султан, ул. А. Минаева, 13,
Республика Казахстан
Тел: 8 (7172) 78 98 28

Электронная почта: pd@pdnari.kz
 Интернет сайт: www.pdnari.kz

Белорусская Республика

Департамент лекарственных средств и

нефармацевтических изделий при Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь
720049, г. Минск, ул. 3-я Липная, 25;

Минь-астан Республикасы

Тел.: 0100-600-28-28, +996-312-21-92-86

В электронном формате: inf@minzdr.by

Электронный сайт: www.minzdr.by

Республика Армения

«Научный центр экспертизы лекарств и

медицинских технологий

ин. академик Э. Габриелян» АДЗТ

0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5, Республика

Армения

Тел.: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Электронный сайт: info@adzt.am

Янтарный сайт: www.adzt.am

3. Хранение препарата Анамента

Хранить препарат в недоступном для ребенка

месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Срок годности

Не применять препарат после истечения

срока годности (срока хранения), указанного

на контурной упаковке, блистер, банка,

контурной упаковке, после вскрытия дат.

Датой истечения срока годности является

последний день данного месяца.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в

оригинальной упаковке (контурная упаковка

упаковка/банка в пакете).

Условия хранения

Не подвергать препарату канникулацию,

высыханию. Уточнить у производителя, как

следует утилизировать (уничтожать) препарат,

который больше не используется.

Эти меры позволят защитить окружающую

среду.

6. Содержимое упаковки и прочие

сведения

Препарат Анамента содержит

действующие вещества, является

контрацептивным средством

Анамента 25 мг/таблетка, Гормоны

содержащая оболочка

Каждая таблетка, содержащая венозный

спиртовой. Содержит 25,3 мг хлоргексидина

гидрохлорида.

Прочие ингредиенты (вспомогательные

вещества): желатин;

Ядро: желтый метилорант 200, лактоза К25,

углеводный спирт.

Пленочная оболочка: спирт-таблеточный,

полиэтиленгликоль-4000, тальк, камфар

краситель.

Прочие ингредиенты (вспомогательные

вещества): желатин;

Ядро: лактоза, метилорант 200, полисорб К25,

капучин стевия.

Пленочная оболочка: спирт-таблеточный,

полиэтиленгликоль-4000, тальк, камфар

краситель, оксид железа красный Е 172.

Анамента 100 мг/таблетка, Гормоны

содержащая оболочка

Каждая таблетка, содержащая венозный

спиртовой.

Прочие ингредиенты (вспомогательные

вещества): желатин;

Ядро: лактоза, метилорант 200, полисорб К25,

капучин стевия.

Пленочная оболочка: спирт-таблеточный,

полиэтиленгликоль-4000, тальк, камфар

краситель, оксид железа красный Е 172.

Внешний вид препарата Анамента и

содержимое упаковки

Анамента 25 мг/таблетка, Гормоны

содержащая оболочка

Каждая таблетка, содержащая венозный

спиртовой.

Прочие ингредиенты (вспомогательные

вещества): желатин;

Ядро: лактоза, метилорант 200, полисорб К25,

капучин стевия.

Пленочная оболочка: спирт-таблеточный,

полиэтиленгликоль-4000, тальк, камфар

краситель, оксид железа красный Е 172.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в

оригинальной упаковке (контурная упаковка

упаковка/банка в пакете).

Условия хранения

Не подвергать препарату канникулацию,

высыханию. Уточнить у производителя, как

следует утилизировать (уничтожать) препарат,

который больше не используется.

Эти меры позволят защитить окружающую

среду.

Держатель регистрационного

уведомления

АО «Фармсинтез», Россия

660037, Иркутская обл., г. Иркутск,

ул. Коммунальная, д. 23, офис 3

Тел.: +7 (3952) 55-03-25

Факс: +7 (3952) 55-03-25

Адрес электронной почты:

info@farm-sintez.ru

Производитель

АО «Фармсинтез», Россия

г. Иркутск, ул. Р. Лодовицкий, д. 104

Все претензии производителя следует направлять

прямому владельцу права на регистрацию

установления или держателю регистрационного

уведомления.

Российская Федерация

АО «Фармсинтез»

660040, г. Иркутск, ул. Э. Лодовицкий, д. 184

Тел.: 8-800-100-15-50

info@farm-sintez.ru

Республика Беларусь

ОЧУ ДПО «Институт межгосударственной

медицины»

220131, г. Минск, ул. Гурьянка 30/39Б

Моб. тел. (+375) +7-201-21-57

info@imn.by

Республика Казахстан

ОЧУ ДПО «Институт межгосударственной

медицины»

050057, г. Алматы, ул. Танкисаева, д. 23, пав. 23,

оф. 202

Тел.: +7(727)-269-54-59, +7(727)-269-54-16

Моб. тел. (+7) +7(701)-21-21-57

info@imn.kz

Юридическая Республика

ОЧУ ДПО «Институт межгосударственной

медицины»

720010, г. Бишкек, ул. Уметалиева, 27

Моб. тел. (+24 часа): +996-555-552-566

info@imn.kg

Республика Армения

ТОО «Фармсинтез»

00603, г. Ереван, общество Восток,

ул. Раффи, 13

Тел.: +374-96-30-30-00

Моб. тел. (+24 часа): +7-201-21-64-21

info@farm-sintez.ru

Листов-вкладыша пересмотрен

Принимая во внимание информацию

поддерживающую сведения о данном препарате

содержащихся на веб-сайте Союза

<http://www.farm-sintez.ru>

Листов-вкладыш доступен на всех языках Союза

на веб-сайте Союза.