

НД РБ
3074 Б-2022

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 01.11.2022 № 1509

Листок-вкладыш – информация для потребителя
МИНОКСИФОР, 20 мг/мл, раствор для наружного применения
Действующее вещество: Миноксидил

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 2 месяца вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Миноксифор и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Миноксифор.
3. Применение препарата Миноксифор.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Миноксифор.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Миноксифор и для чего его применяют

Миноксифор используется для лечения распространенного наследственного выпадения волос у женщин в возрасте 18-65 лет, предотвращает дальнейшее выпадение волос и способствует их повторному росту. Он содержит миноксидил, который, как считается, действует, способствуя притоку крови к волосяным фолликулам на коже головы.

- Миноксифор лучше всего подходит женщинам с общим истончением волос на коже головы.
- Молодой возраст или потеря волос в течение короткого периода времени, скорее всего позволят получить наилучшие результаты.
- Вы вряд ли получите пользу от Миноксифор, если вы лысеете в течение многих лет или у вас большая область выпадения волос.

Наследственное выпадение волос можно распознать из-за характера выпадения волос (см. диаграммы). Это заболевание начинается постепенно и прогрессирует. Заболевание можно прогнозировать, если у вас есть семейная история выпадения волос. Имеются другие диагностированные проблемы с вашим выпадением волос.



СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

2. О чем следует знать перед применением препарата Миноксифор

Не применяйте препарат Миноксифор:

- Если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
 - Если вы беременны или кормите грудью;
 - Если вам меньше 18 лет или больше 65 лет;
 - Если вы не уверены, является ли ваше выпадение волос наследственным;
 - Если у вас выпадение волос, вызванное медикаментозным лечением;
 - Если у вас полное облысение или полная потеря всех волос на теле;
 - Если причина вашего выпадения волос неизвестна, вызвана родами или является внезапной и неожиданной;
 - Если у вас высокое кровяное давление, даже если оно не лечится;
 - Если у вас есть какие-либо заболевания, которые влияют на кожу головы, включая солнечные ожоги и псориаз;
 - Если у вас бритая кожа головы;
 - Если вы используете кремы, мази или лосьоны, предназначенные для лечения заболеваний кожи головы, например:
 - Дитранол – назначают для лечения псориаза.
 - Третиноин – назначают для лечения акне или других кожных заболеваний.
 - Кортикостероиды – тип противовоспалительных средств
 - Вазелин – распространенный ингредиент воска или геля для волос.
 - Если у вас есть какая-либо повязка или повязка на голове.
 - Если вы не знаете, что ваша кожа головы нормальная и здоровая.
- Если какой-либо из этих пунктов относится к вам сейчас или в прошлом, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием Миноксифор.

Обратитесь к своему врачу или фармацевту, если вы не уверены, является ли ваша кожа нормальной.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Миноксидил проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

- Если вы вообще не уверены, является ли ваша кожа головы нормальной и здоровой.
- Если вы страдаете заболеваниями сердца, в том числе нарушениями сердечного ритма или частоты сердечных сокращений, стенокардией или болями в груди и / или нарушениями кровообращения.
- Если вы принимаете или используете какие-либо другие лекарства, включая:
 - некоторые лекарства от артериального давления, называемые "сосудорасширяющими средствами", например гидралазин. Существует потенциальный риск того, что миноксидил, активный ингредиент Миноксифор может взаимодействовать с этими лекарственными средствами и усиливать их действие.

Если вы не уверены в лекарстве, которое принимаете или используете, покажите флакон или упаковку своему фармацевту. Если какой-либо из этих пунктов применим сейчас или в прошлом, поговорите с врачом или фармацевтом.

- Если миноксидил попадает в кровоток, это может вызвать некоторые побочные эффекты, связанные с низким кровяным давлением, такое как боль в груди, учащенное сердцебиение, слабость, головокружение, отек рук и ног, постоянное покраснение или раздражение кожи головы. Если вы испытываете какой-либо из этих побочных эффектов, прекратите прием лекарства и сообщите об этом своему врачу. Когда Миноксифор используется в соответствии с рекомендациями, крайне маловероятно, что эти эффекты возникнут. Однако существует вероятность того, что препарат может попасть в кровоток, если он используется чрезмерно или если есть такие заболевания кожи головы, как псориаз.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ОДРАВНООХРАНИТЕЛЬНОЙ
РАСПЫЛКИ БЕЛАРУСЬ
Центр Министрства Одрасохранення
Рэспублікі Беларусь

Поэтому очень важно, чтобы вы использовали свое лекарство в соответствии с рекомендациями и очень тщательно следовали инструкциям. См. раздел 3.

- Не наносите препарат на другие участки тела, кроме кожи головы. Превышение рекомендуемой дозы не приведет к более быстрому повторному росту ваших волос, и у вас повышится вероятность получения побочных эффектов.
- Случайное проглатывание может вызвать серьезные побочные эффекты со стороны сердца. Поэтому этот продукт следует хранить в недоступном для детей месте.

Дети и подростки

Применение Миноксифора не рекомендуется у детей и подростков до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения препарата у таких пациентов не изучалась.

Другие препараты и препарат Миноксифор

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимали/применяете, недавно принимали/применяли или планируете принимать/применять какие-либо другие препараты.

При применении некоторых сосудорасширяющих лекарств от кровяного давления, например гидралазин, существует потенциальный риск того, что миноксидил, активный ингредиент препарата Миноксифор, может взаимодействовать с этими лекарствами и усиливать их действие.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Миноксифор содержит миноксифор, который может вызвать головокружение или низкое кровяное давление. Если вы испытываете эти симптомы, не садитесь за руль и не управляйте механизмами.

Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ

Лекарство содержит 104,0 мг пропиленгликоля в каждом 1 мл и может вызвать раздражение кожи.

Лекарство содержит 571,0 мг алкоголя что может вызвать жжение на поврежденной коже.

3. Применение препарата Миноксифор

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

- Миноксифор предназначен только для местного и наружного применения. Его следует наносить только непосредственно на кожу головы.
- Избегайте вдыхания спрея во время нанесения на кожу головы.
- Не наносите на другие участки тела, кроме кожи головы.
- Тщательно мойте руки до и после нанесения раствора и промойте другие участки, которые соприкасались с раствором.
- Перед нанесением раствора убедитесь, что ваши волосы и кожа головы полностью сухие.

После применения возможна слабость, головокружение, отек рук и ног, постоянное покраснение или раздражение кожи головы. Если вы испытываете какой-либо из этих побочных эффектов, прекратите прием лекарства и сообщите об этом своему врачу. Когда Миноксифор используется в соответствии с рекомендациями, крайне маловероятно, что эти эффекты возникнут. Однако существует вероятность того, что препарат может попасть в кровоток, если он используется чрезмерно или если есть заболевание кожи головы, такое как псориаз.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- При случайном попадании препарата на участки тела, отличные от кожи головы, тщательно смойте большим количеством воды.

Рекомендуемая доза

Рекомендуемая доза в 1 мл достигается путем 10 нажатий на распыляющую палочку. Препарат наносится на лысый участок кожи и распределяется пальцами равномерно по всей области облысения. Применение следующей дозы препарата рекомендуется через 12 часов. Может потребоваться применение этого лекарства по крайней мере в течение 4 месяцев до того, как вы увидите рост новых волос, это связано с тем, что рост волос – медленный процесс.

Продолжайте использовать Миноксифор два раза в день, чтобы рост продолжался. В клинических испытаниях 3 из каждых 5 женщин сообщили о возобновлении роста волос после 8 месяцев постоянного использования этого продукта.

Передозировка

Если вы применили препарата Миноксифор больше, чем следовало немедленно обратитесь к врачу. Возьмите препарат с собой.

Если вы забыли применить препарат Миноксифор

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы случайно проглотите раствор

Если кто-либо, включая ребенка, проглотит раствор, немедленно доставьте его в больницу (захватите флакон с препаратом с собой, так как врач может захотеть иметь представление о том сколько препарата принято).

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Миноксифор может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Если вы испытываете что-либо из перечисленного, прекратите прием лекарства и немедленно обратитесь за медицинской помощью:

- Боль в груди;
- Отек лица, губ, рта, языка или горла, который может вызвать затруднение глотания или дыхания;
- Аллергические реакции, включая отек лица, покраснение кожи или зуд, а также стеснение в горле;
- Низкое кровяное давление;
- Учащенное сердцебиение или повышенное осознание сердцебиения (учащенное сердцебиение);
- Слабость или головокружение;
- Опухшие руки или ноги, одышка;
- Внезапное необъяснимое увеличение веса;
- Стойкое местное покраснение или сыпь.

Другие эффекты, которые могут возникнуть, включают:

Очень распространено (может поражать более 1 из 10 человек).

- Головная боль.

Распространено (может поражать до 1 из 10 человек).

- Зуд или дерматит.
- Сообщалось о нежелательных волосах, не относящихся к коже головы (включая рост волос на лице у женщин). Всегда тщательно мойте руки после нанесения, и, если вы случайно нанесете раствор на другие части тела, кроме кожи головы, тщательно промойте большим количеством воды.

Редко (может поражать до 1 из 100 человек).

- Тошнота.

Редко (может поражать до 1 из 1000 человек).

<p>СОГЛАСОВАНО МИНИСТЕРСТВОм ЗАРОВОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Принят Министром здравоохранения Республики Беларусь</p>

- Может произойти изменение текстуры волос. Если это произойдет, вам следует прекратить использование Миноксифора.

Частота возникновения не известна:

- Подавленное настроение.
- Раздражение глаз.
- Рвота.
- Сообщалось о раздражении кожи головы, таком как местное покраснение, сухость, шелушение кожи. Это может быть связано с содержанием в продукте пропиленгликоля. При появлении сыпи, зудящей сыпи, волдырей, кровотечения необходимо прекратить использование этого продукта.
- Временное выпадение волос может произойти в течение первых 2-6 недель использования. Вероятно, это происходит в результате изменений в цикле роста, и он должен прекратиться в течение пары недель. В случае дальнейшего продолжения выпадения волос прекратите использование продукта и обратитесь к своему врачу.
- При изменении цвета волос вам следует прекратить использование Миноксифора.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Миноксифор

Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности 30 месяцев.
Не использовать после истечения срока годности.

Меры предосторожности

Легковоспламеняющаяся жидкость: хранить вдали от источников тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей.
Держите контейнер плотно закрытым.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.


6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1 мл раствора содержит 20,0 мг Миноксидила;
Вспомогательные вещества: этиловый спирт 96 %, пропиленгликоль, вода очищенная.
Внешний вид препарата Миноксифор и содержимое упаковки
Бесцветный или слегка окрашенный с желтоватым оттенком прозрачный раствор с запахом спирта.
По 60 мл во флаконах полимерных, укупоренных насадками распыляющими. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в картошной пачке.
Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

ООО «Фортива Мед»
223012, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, г.п. Мачулищи, ул. Аэродромная, д. 4-2, каб.21.
Телефон + 375 17 504 62 87, факс +375 17 301 91 45

Листок-вкладыш пересмотрен:



НДНБ
3074 Б-2022



Листок-вкладыш – информация для потребителя
МИНОКСИФОР, 50 мг/мл, раствор для наружного применения
Действующее вещество: Миноксидил

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 2 месяца вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Миноксифор и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Миноксифор.
3. Применение препарата Миноксифор.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Миноксифор.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Миноксифор и для чего его применяют

Миноксифор представляет собой 50 мг/мл раствор миноксидила для наружного применения. Миноксифор — это лекарство, используемое для лечения распространенного наследственного выпадения волос у мужчин в возрасте 18-65 лет, предотвращает дальнейшее выпадение волос и способствует их повторному росту. Он содержит миноксидил, который, как считается, действует, способствуя притоку крови к волосяным фолликулам на коже головы.

- Лекарство предназначено только для применения у мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.
- Лекарственный препарат лучше всего подходит для мужчин с выпадением или истончением волос на верхней части головы.
- Молодой возраст, потеря волос в течение короткого периода времени или небольшая область облысения могут позволить получить наилучшие результаты лечения.
- Прогнозируемая польза от применения Миноксифор будет скорее всего незначительной, если вы лысеете уже много лет или у вас большая область выпадения волос. Наследственное выпадение волос можно распознать по перечисленным ниже признакам:
- Определенный характер выпадения волос (см. диаграммы).
- Выпадение начинается постепенно и прогрессирует.
- Известно о семейной истории выпадения волос.
- Имеются другие диагностированные проблемы с вашим выпадением волос.



2. О чем следует знать перед применением препарата Миноксифор

Не применяйте препарат Миноксифор:

- Если вы женщина;
- Если вам меньше 18 лет или больше 65 лет;
- Если у вас когда-либо была нежелательная реакция на миноксидил, этанол или пропиленгликоль;
- Если вы не уверены, является ли ваше выпадение волос наследственным;
- Если у вас выпадение волос, вызванное медикаментозным лечением;
- Если у вас полное облысение или полная потеря всех волос на теле;
- Если причина вашего выпадения волос неизвестна или оно произошло внезапно и неожиданно;
- Если у вас высокое кровяное давление, даже если оно не лечится;
- Если у вас есть какие-либо заболевания, которые влияют на кожу головы, включая солнечные ожоги и псориаз;
- Если у вас бритая кожа головы;
- Если вы используете кремы, мази или лосьоны, предназначенные для лечения заболеваний кожи головы, например:
 - Дитранол – используется для лечения псориаза;
 - Третиноин – используется для лечения акне или других кожных заболеваний;
 - Кортикостероиды – разновидность противовоспалительных средств;
 - Вазелин - распространенный ингредиент воска или геля для волос.
- Если у вас есть какая-либо повязка или повязка на голове.
- Если вы не знаете, что ваша кожа головы нормальная и здоровая.

Если какой-либо из этих пунктов применим к вам сейчас или в прошлом, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, прежде чем использовать Миноксифор.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Миноксидил проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

- Если вы вообще не уверены, является ли ваша кожа головы нормальной и здоровой.
- Если вы страдаете заболеваниями сердца, в том числе нарушениями сердечного ритма или частоты сердечных сокращений, стенокардией или болями в груди и / или нарушениями кровообращения.
- Если вы не уверены в лекарстве, которое принимаете или используете, покажите флакон или упаковку своему фармацевту. Если какой-либо из этих пунктов применим сейчас или в прошлом, поговорите с врачом или фармацевтом.
- Если миноксидил попадет в кровоток, это может вызвать некоторые побочные эффекты, связанные с низким кровяным давлением, такое как боль в груди, учащенное сердцебиение, слабость, головокружение, отек рук и ног, постоянное покраснение или раздражение кожи головы. Если вы испытываете какой-либо из этих побочных эффектов, прекратите прием лекарства и сообщите об этом своему врачу. Когда Миноксифор

используется в соответствии с рекомендациями, крайне маловероятно, что эти эффекты возникнут. Однако существует вероятность того, что препарат может попасть в кровоток, если он используется чрезмерно или если есть такие заболевания кожи головы, как псориаз. Поэтому очень важно, чтобы вы использовали свое лекарство в соответствии с рекомендациями и очень тщательно следовали инструкциям (см. раздел 3).

- Не наносите препарат на другие участки тела, кроме кожи головы. Превышение рекомендуемой дозы не приведет к более быстрому повторному росту ваших волос, и у вас повышается вероятность получения побочных эффектов.

- Случайное проглатывание может вызвать серьезные побочные эффекты со стороны сердца. Поэтому этот продукт следует хранить в недоступном для детей месте.

Дети и подростки

Применение Миноксифора не рекомендуется у детей и подростков до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения препарата у таких пациентов не изучалась.

Другие препараты и препарат Миноксифор

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимали/применяете, недавно принимали/применяли или планируете принимать/применять какие-либо другие препараты.

При применении некоторых сосудорасширяющих лекарств от кровяного давления, например гидразалин, существует потенциальный риск того, что миноксидил, активный ингредиент препарата Миноксифор, может взаимодействовать с этими лекарствами и усиливать их действие.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Миноксифор содержит миноксидил, который может вызвать головокружение или низкое кровяное давление. Если вы испытываете эти симптомы, не садитесь за руль и не управляйте механизмами.

Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ

Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

Препарат содержит этанол (спирт), который может вызвать жжение и раздражение при попадании в глаза.

При случайном попадании в глаза, рот или на порез, поврежденную кожу хорошо промойте область большим количеством прохладной водопроводной воды.

3. Применение препарата Миноксифор

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Миноксифор предназначен только для наружного применения на кожу головы.

- Избегайте вдыхания спрея во время применения.
- Не наносите препарат на другие участки тела кроме кожи головы.
- Тщательно мойте руки до и после нанесения раствора и промойте другие участки, которые соприкасались с раствором.
- Перед нанесением раствора убедитесь, что ваши волосы и кожа головы полностью сухие.

Рекомендуемая доза

Препарат применяется для мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.



- На полностью сухую кожу головы и волосы наносите дозу по 1 мл на всю пораженную область два раза в день, для достижения 1 дозы выполняется 10 нажатий на распыляющую насадку.

- После нанесения раствор следует легкими массирующими движениями втереть в кожу головы.

Рекомендуется 12 часовой перерыв между использованием.

- Не наносите более 2 мл в день.
- Не используйте чаще двух раз в день.
- Препарат противопоказан для женщин.

Продолжение лечения

- Возможно, вам придется использовать это лекарство два раза в день в течение по крайней мере 2 месяцев, прежде чем вы увидите рост новых волос, это связано с тем, что рост волос - медленный процесс.

- Рост волос вначале может быть пушковым, со временем должны появиться нормальные волосы.

- Как только волосы начнут отрастать заново, вам необходимо продолжать использовать это лекарство два раза в день, чтобы рост продолжался. В клинических испытаниях 3 из каждых 5 мужчин сообщили о появлении волос. Повторный рост наблюдался после 48 недель непрерывного использования продукта.

- Когда вы прекратите прием лекарства, отросшие волосы могут исчезнуть через 3-4 месяца, и процесс выпадения волос продолжится.

- Если у вас нет улучшения в росте волос после одного года использования, вам следует прекратить лечение.

- Если в какой-либо момент во время лечения вы испытываете беспокойство, вам следует проконсультироваться со своим врачом или фармацевтом.

Передозировка

Немедленно обратитесь к врачу, если кто-либо, включая ребенка, применил слишком много препарата. Возьмите лекарственный препарат с собой.

Если вы забыли применить препарат Миноксифор

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы случайно проглотите раствор

Если кто-либо, включая ребенка, проглотит раствор, немедленно доставьте его в больницу (захватите флакон с препаратом с собой, так как врач может уточнить сколько препарата принято).

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Миноксифор может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Если вы испытываете что-либо из перечисленного, прекратите прием лекарства и немедленно обратитесь за медицинской помощью:

- Боль в груди;
- Отек лица, губ, рта, языка или горла, который может вызвать затруднение глотания или дыхания.

Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, прекратите прием лекарства и обратитесь к своему врачу:

- Аллергические реакции, включая отек лица, покраснение кожи или зуд, а также стеснение в горле;
- Низкое кровяное давление;
- Учащенное сердцебиение или повышенное осознание сердцебиения;
- Слабость или головокружение;

- Опухшие руки или ноги, одышка;
- Внезапное необъяснимое увеличение веса;
- Стойкое местное покраснение или сыпь.

Другие эффекты, которые могут возникнуть, включают:

Очень распространено (может поражать более 1 из 10 человек)

- Головная боль.

Распространено (может поражать до 1 из 10 человек)

- Зуд или дерматит

Сообщалось о нежелательных волосах, не относящихся к коже головы (включая рост волос на лице у женщин). Всегда тщательно мойте руки после нанесения, и, если вы случайно нанесете раствор на другие части тела, кроме кожи головы, тщательно промойте большим количеством воды.

Редко (может поражать до 1 из 100 человек)

- Тошнота.

Очень редко (может поражать до 1 из 1000 человек)

- Может произойти изменение текстуры волос. Если это произойдет, вам следует прекратить использование Миноксифора.

Частота не известна:

- Подавленное настроение;

- Раздражение глаз;

- Рвота.

- Сообщалось о раздражении кожи головы, таком как местное покраснение, сухость, шелушение кожи. Это может быть связано с содержанием в продукте пропиленгликоля.

Обычно это лишь временный эффект, но если он стойкий, вам следует прекратить использование препарата.

- Угревая сыпь, зудящая сыпь, образование пузырей, кровотечение или изъязвление.

- Временное выпадение волос может произойти в течение первых 2-6 недель использования.

Вероятно, это происходит в результате изменений в цикле роста, и должно прекратиться в течение пары недель. В случае дальнейшего продолжения выпадения волос прекратите использование Миноксифора и обратитесь к своему врачу.

- При изменении цвета волос вам следует прекратить использование Миноксифора.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Миноксифор

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 30 месяцев.

Не использовать после истечения срока годности.

Меры предосторожности


Легковоспламеняющаяся жидкость: хранить вдали от источников тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей.

Держите флакон плотно закрытым.

Хранить в хорошо проветриваемом месте.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1 мл раствора содержит 50,0 мг Миноксидила.



Вспомогательные вещества: этиловый спирт 96 %, пропиленгликоль, вода очищенная.

Внешний вид препарата Миноксифор и содержимое упаковки

Бесцветный или слегка окрашенный с желтоватым оттенком прозрачный раствор с запахом спирта.

По 60 мл во флаконах полимерных, укупоренных насадками распыляющими. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной пачке.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

ООО «Фортива Мед»

223012, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, г.п. Мачулищи, ул. Аэродромная, д. 4-2, каб.21.

Телефон + 375 17 504 62 87, факс +375 17 301 91 45

Листок-вкладыш пересмотрен:

