

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
лекарственного средства  
**Мирасол-Рн**

информация для пациентов**Название лекарственного средства:**

*Торговое название:* Мирасол-Рн.

*Международное непатентованное название:* отсутствует.

**Описание:** Прозрачный бесцветный раствор, пенящийся при встряхивании.

**Состав:**

Флакон 100 мл содержит:

действующее вещество: мирамистин (бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил]-аммония хлорид) — 10,0 мг;

вспомогательное вещество: вода очищенная — до 100 мл.

**Форма выпуска:** Раствор для местного применения.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Дерматологические средства. Антисептические и дезинфицирующие средства.

**Код АТС:** D08AJ.

**Показания к применению:**

В хирургии, травматологии — профилактика нагноений и лечение гнойных ран, лечение гнойно-воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата.

В комбустиологии — лечение поверхностных и глубоких ожогов II и IIIa степени, подготовка ожоговых ран к дерматопластике.

В урологии — комплексное лечение острых и хронических уретритов и уретропростатитов специфической (хламидиоз, трихомониаз, гонорея) и неспецифической природы.

В акушерстве-гинекологии — профилактика и лечение нагноений послеродовых травм, ран промежности и влагалища, послеродовых инфекций, воспалительных заболеваний (вульвовагиниты, цервициты), генитальном кандидозе, для профилактики инфицирования родовых травм.

В стоматологии — лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта: стоматитов, гингивитов, пародонитов, периодонтитов. Гигиеническая обработка съемных зубных протезов.

В дерматологии, венерологии — для лечения и профилактики пиодермий и дерматомикозов, кандидозов кожи и слизистых оболочек, микозов стоп и крупных складок.

Оториноларингология — при наружном отите и тимпаните, при комплексном лечении острых и хронических отитов, гайморитов, тонзилитов, ларингитов, фарингитов. У детей в возрасте от 3 до 14 лет применяется для комплексного лечения острого фарингита и/или обострения хронического тонзилита.

Для индивидуальной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес, генитальный кандидоз и др.).

**Способ применения и дозировка:**

Для местного применения.

При гнойных ранах и ожогах марлевую салфетку обильно смачивают препаратом и накладывают на инфицированную рану или ожоговую поверхность под окклюзионную повязку.

После операции по поводу остеомиелита орошают раствором через дренаж и рыхло тампонируют послеоперационную рану и свищевые ходы тампонами, смоченными раствором 0,1 мг/мл Мирасола-Рн.

При лечении уретритов и уретропростатитов применяют интрауретрально в объеме 2-5 мл 2-3 раза/сутки в течение 5-7 дней (в комплексе с другими препаратами).

При воспалительных заболеваниях женских половых органов проводится ежедневное интравaginaльное введение тампонов, смоченных раствором, либо органный электрофорез в течение 10-14 дней.

Для профилактики инфицирования родовых путей: начиная с раннего послеродового периода каждые 2 ч во влагалище вводят обильно смоченные тампоны.

При наружном отите, тимпаните турунды, смоченные раствором, вводят в наружный слуховой проход на 2-3 часа в течение 6-8 дней; при гайморитах - обильно промывают верхнечелюстную пазуху после пункции и удаления гноя; при тонзиллите и фарингите рекомендуется полоскание горла раствором 4-6 раз в день.

Для экстренной профилактики заболеваний, передающихся половым путем: не позже 2 ч после случайного контакта после тщательного туалета наружных половых органов обрабатывают их ватным тампоном, обильно смоченным раствором Мирасол-Рн, затем носик насадки вводят в наружное отверстие мочеиспускательного канала и выдавливают 1,5-3 мл (мужчины) и 1-1,5 мл (женщины), во влагалище - 5-10 мл. Не разжимая пальцы, насадку извлекают из отверстия мочеиспускательного канала, а раствор задерживают на 2-3 мин. После процедуры не рекомендуется мочиться в течение 2 ч.

*Отоларингология:*

Применение у детей:

Во избежание проглатывания раствора, затекания его в носовые ходы и попадания в дыхательные пути перед полосканием горла необходимо убедиться, что ребенок понимает и владеет техникой полоскания горла. У детей младшего возраста во время полоскания горла требуется контроль со стороны взрослых.

**Побочное действие:**

Аллергические реакции.

Местно - чувство жжения в месте применения (проходит самостоятельно в течение 10-15 с и не требует отмены препарата).

**Противопоказания:**

Гиперчувствительность.

**Передозировка:**

Случаи передозировки неизвестны. При попадании внутрь препарат практически не абсорбируется, поэтому системные эффекты маловероятны. Тем не менее, при случайном проглатывании необходимо провести промывание желудка. При необходимости проводят симптоматическую терапию.

**Меры предосторожности:**

Не следует допускать попадания препарата в глаза.

**Применение в педиатрии:**

Опыт клинического применения у детей ограничен. Использование у детей требует врачебной консультации для оценки соотношения ожидаемой пользы и возможного риска использования Мирасола-Рн.

**Применение во время беременности и в период лактации:**

Нет данных о безопасности применения препарата во время беременности и в период лактации. Возможно применение препарата, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

2923 Б-2021

**Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами:**

Не влияет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении Мирасола-Рн с антибиотиками резистентность к антибиотикам бактерий и грибов снижается.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

*Хранить в недоступном для детей месте!*

**Срок годности:**

3 года. Срок хранения флакона после первого вскрытия не более 1 месяца.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта врача.

**Упаковка:**

По 100 мл во флаконе полимерном с конической насадкой-вставкой, снабженном крышкой закручивающейся полиэтиленовой с системой контроля первого вскрытия с листком-вкладышем в пачке картонной.

**Производитель:**

ООО «Рубикон», Республика Беларусь, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,  
тел: +375 (212) 36-47-77, тел/факс +375 (212) 36-37-06, e-mail: [secretar@rubikon.by](mailto:secretar@rubikon.by)

