

9929 - 2024

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: информация для пациента

ОКСОЛИН-АВ, 2,5 мг/г, мазь назальная

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз. Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 3-4 дня вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Оксолин-АВ и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Оксолин-АВ.
3. Применение препарата Оксолин-АВ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Оксолин-АВ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.



1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ОКСОЛИН-АВ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Оксолин-АВ содержит действующее вещество диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин), относится к группе противовирусных препаратов.

Препарат Оксолин-АВ применяется для профилактики гриппа, лечения вирусных ринитов у взрослых, подростков и детей с 2-х лет.

Противовирусное действие препарата связано с тем, что, блокируя места связывания вируса гриппа с поверхностью клетки, он защищает ее от проникновения вируса.

В организме не накапливается и выводится в основном почками в течение суток.

9929 - 2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Иркутская областная клиническая больница
Магданская областная клиническая больница

Применение лекарственного препарата основано на опыте длительного применения.

При лечении вирусных ринитов у детей применение необходимо осуществлять под наблюдением врача.

При лечении вирусных ринитов у взрослых препарат допускается для самостоятельного приема в течение 3-4 дней.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через 3-4 дня, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ОКСОЛИН-АВ

Не применяйте препарат Оксолин-АВ:

- если у вас или вашего ребенка аллергия на диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин) или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- у детей до 2 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Оксолин-АВ проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

С осторожностью применяйте препарат при беременности, в период грудного вскармливания.

Следует избегать контакта препарата с глазами. При попадании на слизистую оболочку глаза мазь смыть большим количеством теплой воды. Если после промывания глаз водой неприятные ощущения сохраняются, необходимо обратиться к врачу.

Препарат при попадании на кожу не оказывает раздражающего действия.

При выявлении повышенной чувствительности к диоксотетрагидрокситетрагидронафталину или к любому из вспомогательных веществ препарата необходима отмена препарата и симптоматическое лечение.

Препарат Оксолин-АВ не предназначен для лечения вирусных заболеваний глаз (вирусного конъюнктивита, вирусного блефарита, офтальмогерпеса и т. д.).

Применение препарата Оксолин-АВ у детей необходимо осуществлять под наблюдением врача.

Другие препараты и препарат Оксолин-АВ

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Взаимодействия препарата Оксолин-АВ с другими лекарственными препаратами не изучались.

Препарат Оксолин-АВ с пищей и напитками

Препарат не взаимодействует с пищей и напитками.

Препарат нельзя использовать в ротовой полости и глотать его.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

До настоящего времени не опубликовано сообщений о риске, связанном с применением мази Оксолина, для беременных и кормящих грудью женщин и их детей. Применение препарата Оксолин-АВ возможно, если польза для матери больше, чем вероятность отрицательного влияния на ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ОКСОЛИН-АВ

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Для профилактики гриппа: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают ежедневно 2-3 раза в день слизистую оболочку полости носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа или при контакте с больным гриппом. Длительность применения — 25 дней.

Лечение вирусного ринита: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают слизистую оболочку полости носа 2-3 раза в день. Длительность применения — от 3 до 4 дней.


Если в течение 3-4 дней улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение у детей

Препарат Оксолин-АВ не следует применять у детей в возрасте до 2-х лет.

Применение препарата Оксолин-АВ у детей необходимо осуществлять под наблюдением врача.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.



Способ применения

Наносите препарат на слизистую оболочку полости носа чистыми руками.

Перед применением алюминиевую тубу вскрыть при помощи пластикового колпачка, навинчивая его стороной, снабженной конусообразным приспособлением для прокола защитной мембраны. Извлечь 3-5 мм мази с помощью аккуратного надавливания на кончик тубы.

Не используйте препарат в ротовой полости и не глотайте его. При случайном проглатывании препарата необходимо обратиться к врачу.

При попадании на слизистую оболочку глаз смойте мазь большим количеством теплой воды. Если после промывания глаз водой неприятные ощущения сохраняются, вам необходимо обратиться к врачу.

Если вы применили больше препарата Оксолин-АВ, чем следовало

Если вы применили больше препарата и вы или ваш ребенок чувствуете ухудшение, жжение слизистой оболочки полости носа, при обильных слизистых (водянистых) выделениях из полости носа, насморке необходимо обратиться к врачу.

Если вы забыли применить препарат Оксолин-АВ

Нанесите мазь при первой возможности, однако предварительно убедитесь, что вы не превышаете частоту (2-3 раза в день) применения препарата. Не следует удваивать дозу во время следующего применения препарата.

Если вы прекратили применение препарата Оксолин-АВ

Отмена препарата не вызывает нежелательных реакций.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат Оксолин-АВ может вызвать следующие нежелательные реакции:

- редко (могут возникать менее чем у 1 человека из 1000) – синее окрашивание слизистой оболочки полости носа;
- частота неизвестна – быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки полости носа, обильные слизистые (водянистые) выделения из полости носа, насморк.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-

вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, (РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», перейдя на сайт <https://www.rceth.by>).

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ОКСОЛИН-АВ

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и алюминиевой тубе после надписи «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Нет особых требований к утилизации.



6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное перечисление действующего вещества и вспомогательных веществ

Препарат Оксолин-АВ содержит:

Действующим веществом является диоксотетрагидрокситетрагидронафталин.

1 г препарата содержит 2,5 мг диоксотетрагидрокситетрагидронафталина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: вазелиновое масло, вазелин.

Внешний вид препарата Оксолин-АВ и содержимое его упаковки

Однородная мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Мазь назальная 2,5 мг/г, по 10 г упакована в тубу алюминиевую.

Тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек – без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ЗАО «Алтайвитамины»

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Телефоны: (3854) 338-719, 326-948

Факс (3854) 326-943

office@altayvitamin.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте: www.rceth.by.