

44-60
6863 - 2018

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
по медицинскому применению препарата
Климаксан гомеопатический

Торговое название

Климаксан гомеопатический

Форма выпуска

Таблетки гомеопатические.

Состав (на 1 таблетку)

Активные вещества (в виде гомеопатической тритурации в соотношении 1:1:1) – 0,0024 г: *Cimicifuga racemosa* (Цимицифуга рацемоза) C200, *Lachesis mutus* (Лажезис мутус) C50, *Apis mellifica* (Апис меллика) C200.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат – 0,2112 г, целлюлоза микрокристаллическая – 0,0240 г, магния стеарат – 0,0024 г.

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, белого или почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологическое действие

При климактерическом синдроме смягчает психоэмоциональные проявления (эмоциональную лабильность, раздражительность, нарушение сна), снижает выраженность вегетативных реакций («приливы», потливости, сердцебиения, головной боли, головокружения).

Фармакокинетика

Чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия) не позволяет оценивать содержание гомеопатических лекарственных средств в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики препарата Климаксан гомеопатический.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических показаний. Традиционно применяется в качестве симптоматического средства в терапии проявлений климактерического синдрома (раздражительность, эмоциональная лабильность, нарушения сна, головная боль, головокружение, сердцебиение, потливость, «приливы»).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст до 18 лет.

Беременность и лактация

Препарат Климаксан гомеопатический противопоказан к применению у женщин в период беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

На один прием – 1 таблетку (держат в рту до полного растворения – не во время приема пищи), принимать 2 раза в день, утром и вечером.

В зависимости от тяжести симптомов возможно увеличение приема препарата до 3-4 раз в день.

Рекомендуемая длительность применения препарата составляет 6 месяцев. Возможно проведение повторных курсов лечения по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Передозировка

При передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата вспомогательными веществами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрированы. В случае одновременного применения с препаратами, содержащими эстрогены, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами

Отрицательного влияния препарата Климаксан гомеопатический на способность управлять транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами не выявлено.

Меры предосторожности

В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Больным сахарным диабетом следует помнить, что 1 таблетка препарата содержит 0,2136 г лактозы моногидрата, что соответствует 0,018 хлебным единицам (ХЕ). Максимальная суточная доза препарата составляет 4 таблетки, что соответствует 0,072 ХЕ.

В период проведения курса лечения препаратом рекомендуется не реже 1 раза в 2 месяца консультироваться с лечащим врачом в целях возможной коррекции терапии.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Данные по применению препарата у пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как миома матки, фиброзно-кистозная мастопатия ограничены, поэтому использование препарата у данного контингента требует осторожности.

6863 - 2018

Отсутствует опыт применения у пациентов, получающих препараты заместительной гормональной терапии, а также получающих в настоящее время или получавших ранее лечение в связи с эстрогензависимыми опухолями, при прогрессирующей (злокачественной) артериальной гипертензии, сахарном диабете, хронической сердечной недостаточности 1-4 функционального класса. Опыт применения у пациентов с нарушением функции печени и почек отсутствует.

Упаковка

Таблетки гомеопатические.

По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 1 или 2 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению и/или листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;

Россия, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9.

Тел./факс: +7 (495) 684-43-33.

Адрес места производства лекарственного средства

Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 54.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Беларусь претензии от потребителей по качеству продукции

Представительство ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» в Республике Беларусь:


220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65 Б, помещение 74 А.

Тел./факс: +375 (17) 323-58-68.

E-mail: bel@dep.materiamedica.ru

Директор Департамента регистрации

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»



Е. Ганкина