



**Листок-вкладыш – информация для потребителя
КЛОФЕЛИН,
таблетки 0,15 мг**

Действующее вещество: клонидин (в виде клонидина гидрохлорида)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат КЛОФЕЛИН и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата КЛОФЕЛИН
3. Применение препарата КЛОФЕЛИН
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата КЛОФЕЛИН
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат КЛОФЕЛИН,
и для чего его применяют**

Препарат КЛОФЕЛИН содержит действующее вещество – клонидин. Препарат принадлежит к группе антигипертензивных лекарственных средств.

КЛОФЕЛИН применяется для снижения артериального давления (лечения гипертензии).

**2. О чем следует знать перед применением препарата
КЛОФЕЛИН**

Не принимайте КЛОФЕЛИН, если:

- у Вас повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата, перечисленных в разделе 6;
- у Вас выраженная синусовая брадикардия (снижение частоты сердечных сокращений);
- у Вас медленный сердечный ритм, вследствие проблем с сердцем;
- Вы беременны, предполагаете, что можете быть беременны или кормите ребенка грудью.


Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из вышеперечисленного, сообщите об этом лечащему врачу перед применением препарата КЛОФЕЛИН.

Применение препарата КЛОФЕЛИН у детей младше 18 лет противопоказано.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата КЛОФЕЛИН проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- у Вас болезнь Рейно (проблема с кровообращением в пальцах рук и ног) или другие проблемы с кровообращением, включая кровообращение в мозге;
- у Вас проблемы с сердцем или почками;



- у Вас депрессия или когда-нибудь была депрессия;
- у Вас запор;
- у Вас сахарный диабет;
- у Вас нервное расстройство, при котором Вы воспринимаете свои руки и ноги по-другому («измененное ощущение»), или у Вас снижается артериальное давление, когда Вы встаете.

Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из вышеперечисленного, сообщите лечащему врачу перед применением препарата КЛОФЕЛИН.

Если Вы носите контактные линзы, то во время лечения препаратом КЛОФЕЛИН у Вас может появиться сухость глаз.

Другие препараты и КЛОФЕЛИН

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это также относится к любым растительным препаратам или препаратам, отпускаемым без рецепта врача.

КЛОФЕЛИН может влиять на работу некоторых препаратов. Также некоторые другие препараты могут влиять на работу КЛОФЕЛИНА. Сообщите врачу, если Вы принимаете:

- другие препараты, которые вызывают сонливость;
- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен;
- препараты для лечения депрессии, такие как имипрамин или мirtазапин;
- препараты для лечения тяжелых психических заболеваний, таких как шизофрения. Они также известны как «нейролептики» и включают в себя хлорпромазин.

Также сообщите Вашему врачу, если Вы принимаете любой из перечисленных препаратов для снижения высокого артериального давления или для лечения других проблем с сердцем:

- бета-адреноблокаторы, такие как атенолол;
- мочегонные («диуретики»), такие как фрусемид;
- альфа-блокаторы, такие как празозин или доксазозин. Их также могут применять для лечения заболеваний простаты у мужчин;
- вазодилататоры, такие как диазоксид или нитропруссид натрия;
- антагонисты кальция, такие как верапамил или дилтиазем гидрохлорид;
- ингибиторы АПФ, такие как каптоприл или лизиноприл;
- дигиталисные гликозиды, такие как дигоксин;

Если Вы не уверены, относится ли что-нибудь из вышеперечисленного к Вам, проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата КЛОФЕЛИН.

Лабораторные анализы

Если Вам необходимо сдать анализ крови, то перед забором крови обязательно предупредите врача, что Вы принимаете КЛОФЕЛИН, так как данный препарат может влиять на показатели анализов печени.

Операционные вмешательства

Если Вам необходимо операционное вмешательство, продолжайте принимать препарат КЛОФЕЛИН. Если Вам необходима госпитализация, то возьмите таблетки с собой.

Прием КЛОФЕЛИНА с едой и напитками

Вы можете чувствовать сонливость при приеме препарата КЛОФЕЛИН. Употребление алкоголя может усугубить ситуацию.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Не принимайте КЛОФЕЛИН, если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность. Применение во время беременности противопоказано. При необходимости применения в период лактации следует прекратить кормление грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Вы можете чувствовать сонливость, головокружение или некоторые нарушения зрения. Если у Вас появились данные симптомы, Вы не должны водить машину, работать с механизмами или принимать участие в любых действиях, которые могут подвергнуть Вас или других людей риску.

Важная информация о вспомогательных веществах

КЛОФЕЛИН содержит лактозу (вид сахара). Если врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

3. Применение препарата КЛОФЕЛИН

Препарат следует применять в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Ваш врач назначит лечение с низкой дозы и постепенно будет ее увеличивать. Это будет зависеть от того, насколько хорошо контролируется Ваше артериальное давление.

Способ применения

- Препарат принимают внутрь, независимо от приема пищи.
- Обычная начальная доза составляет 0,15 мг в сутки.
- При необходимости Ваш врач постепенно увеличит дозу.
- У большинства пациентов артериальное давление контролируется при приеме доз от 0,3 мг до 1,2 мг.

КЛОФЕЛИН не применяется у детей и подростков младше 18 лет.

Если Вы приняли больше препарата КЛОФЕЛИН, чем следовало

Не принимайте КЛОФЕЛИН больше назначенной врачом дозы.

Если Вы приняли больше назначенной дозы, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Возьмите с собой упаковку, даже если там не осталось таблеток.

Если Вы пропустили прием препарата КЛОФЕЛИН

Если Вы пропустили прием дозы, примите ее, как только вспомните об этом. Однако, если подошло время для приема следующей дозы, пропустите пропущенную дозу. Не следует принимать двойную дозу с целью восполнения пропущенной дозы.

Если Вы досрочно прекращаете прием препарата КЛОФЕЛИН

Не прекращайте прием препарата КЛОФЕЛИН без консультации с врачом.

Внезапное прекращение применения препарата может привести к повышению артериального давления и развитию «синдрома отмены» (нервозности, головной боли, тошноте), поэтому отмену препарата следует проводить только постепенно.

При наличии дополнительных вопросов по применению данного препарата обратитесь к врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, КЛОФЕЛИН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.


При применении препарата возможно развитие следующих нежелательных реакций:

Очень часто (могут проявляться более чем у 1 из 10 человек):

- головокружение, седация (чувство усталости и большей расслабленности, чем обычно);
- чувство головокружения при вставании (давление падает слишком резко);
- сухость во рту.

Часто (могут проявляться менее чем у 1 из 10 человек):

- нарушение сна, депрессия;
- головная боль;
- запор, тошнота, рвота, боль за ухом (боль в слюнных железах);
- эректильная дисфункция;



- усталость.

Нечасто (могут проявляться менее чем у 1 из 100 человек):

- проблемы с пониманием происходящего вокруг, беспокойство, галлюцинации, ночные кошмары;
- парестезии (спонтанно возникающие ощущения жжения, покалывания, ползания мурашек);
- снижение частоты сердечных сокращений;
- синдром Рейно (спазм сосудов кистей в ответ на воздействие холода или эмоционального напряжения);
- кожная сыпь, зуд, крапивница (крапивная лихорадка);
- чувство дискомфорта и усталости (недомогание).

Редко (могут проявляться менее чем у 1 из 1 000 человек):

- увеличение грудной железы (гинекомастия) у мужчин;
- сухость глаз;
- нерегулярный сердечный ритм;
- сухость слизистой носа;
- псевдообструкция толстой кишки, вызывающая колики, рвоту и запоры.

Незамедлительно свяжитесь с врачом, если у Вас появились эти симптомы:

- выпадение волос;
- повышение уровня глюкозы в крови.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- спутанность сознания, снижение полового влечения;
- нечеткое зрение;
- аномально медленное сердцебиение.

Сообщалось о двух случаях развития гепатита (воспаление печени). Это может быть выявлено по некоторым анализам крови.

Ваше тело может удерживать больше воды, чем обычно (задержка жидкости).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата КЛОФЕЛИН

Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 4 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Датой истечения срока годности является последний день месяца, предшествующего указанному на упаковке.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

Одна таблетка содержит *действующее вещество* – клофелин (в виде клонидина гидрохлорида) – 0,15 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, магния стеарат Е 572, крахмал картофельный.

Внешний вид препарата КЛОФЕЛИН и содержимое упаковки

КЛОФЕЛИН – таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические, с фаской. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. Три, пять контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: